

TRANSCRIPCIÓN (página 1 de 2)

Si usted tiene presión arterial alta, angina u otros problemas del corazón, es posible que le prescriban Norvasc. También puede estar familiarizado con su nombre genérico, Amlodipino. Norvasc es un medicamento con una buena advertencia, lo que significa que si usted no lo toma exactamente como se lo prescribieron, le puede causar una enfermedad o lesión.

El corazón es un músculo que bombea sangre rica en oxígeno y nutrientes a través de su cuerpo. Con el tiempo, ciertos problemas de salud pueden causar que los vasos sanguíneos se endurezcan y se tornen inflexibles. Su corazón tendrá dificultades para hacer su trabajo, lo que puede originar graves problemas de salud. Norvasc ayuda a que los vasos sanguíneos se relajen y se ensanchen, para que la sangre fluya más fácilmente.

Norvasc viene en una tableta. Su proveedor de atención médica decidirá la cantidad que usted necesita tomar, pero las dosis van de 2,5 a 10 miligramos.

Norvasc es un poderoso medicamento. Algunas personas no deben tomarlo. No tome Norvasc si es alérgico a cualquier de sus ingredientes. Si está embarazada o planea quedar embarazada, hable con su médico antes de tomar Norvasc. No puede lactar cuando toma Norvasc.

Antes de tomar Norvasc, dígame a su profesional médico si tiene antecedentes de problemas de enfermedades cardíacas o del hígado. Antes de tomar Norvasc, dele a su proveedor de atención médica una lista completa de todos los medicamentos que ingiere, incluyendo vitaminas y suplementos de hierbas.

Algunos efectos secundarios de Norvasc incluyen mareo, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, enrojecimiento en la cara, el cuello y la parte superior del pecho. Si nota cualquiera de estos efectos secundarios infórmele a su profesional médico.

Tenga en cuenta que usted se encuentra en mayor riesgo de caerse cuando toma Norvasc. Si está acostado o sentado, levántese lentamente. No conduzca ni opere maquinaria pesada, incluyendo su auto, hasta que sepa cómo le afecta Norvasc.

Si presenta una reacción alérgica severa, sensación de mareo, latidos cardíacos fuertes, hinchazón en las manos, los tobillos o los pies, dolor en el pecho que se extiende al brazo u hombros o sudoración, llame al 911 y pida ayuda de inmediato. Esta no es una lista completa de los efectos secundarios. Asegúrese de discutir todos los posibles efectos secundarios con su proveedor de atención médica.

(Continúa en la siguiente página)

TRANSCRIPCIÓN (página 2 de 2)

Tome Norvasc exactamente como se lo prescribieron. No modifique su dosis.

Norvasc debe tomarse una vez al día. Si usted olvida una dosis, tómela tan pronto lo recuerde. Si ya casi es la hora para su próxima dosis, omita la dosis olvidada y vuelva a su horario normal de medicación.

No puede doblar una dosis. Si usted considera que ha tomado demasiado Norvasc, llame a su proveedor de atención médica.

Almacene Norvasc lejos de la humedad y de la luz directa del sol. El botiquín del baño no es el mejor lugar debido a la humedad. No deje su medicamento donde pueda recibir demasiado calor o demasiado frío. Guarde siempre su medicamento, fuera de la vista y lejos del alcance de los niños para evitar accidentes.

Norvasc puede ayudar a su corazón a trabajar más fácilmente. Pero es un poderoso medicamento que sólo se debe tomar exactamente como se lo prescribieron. Si usted tiene alguna pregunta sobre Norvasc, pregúntele a su médico o farmacéuta para obtener más información.