

Transcripción

Si usted tiene dolor de moderado a severo, es posible que le prescriban Ultram. Quizá está más familiarizado con su nombre genérico, Tramadol.

El Ultram es un medicamento de alerta máxima, lo que significa que si usted no lo toma exactamente según lo prescrito puede causarle enfermedad o lesión.

Para entender cómo trabaja el Ultram, démosle un vistazo a cómo el dolor afecta a su cuerpo.

Miles de diminutas células nerviosas en su cuerpo originan muchas sensaciones; frío, calor, presión y dolor. Cuando su cuerpo se lesioná, las pequeñas células nerviosas envían un mensaje al cerebro que dice: tengo dolor aquí.

Ultram trabaja en el cerebro modificando la manera cómo su cuerpo se siente y responde al dolor.

Ultram viene en una tableta y está disponible en diferentes tipos de dosis. Le pueden recetar una dosis de acción corta para el dolor que aparece y desaparece. O le pueden recetar una dosis de acción prolongada para el dolor que permanece todo el tiempo. En algunos casos, el médico puede recomendarle a usted una combinación de acción corta y de acción prolongada. Asegúrese de entender exactamente lo que usted está tomando y cómo se supone que debe tomarlo para evitar lesiones.

Ultram es un medicamento potente. Algunas personas no deben tomarlo. No tome Ultram si es alérgico al Tramadol.

No tome Ultram si usted tiene bloqueo estomacal o intestinal.

Si usted está embarazada, o planea quedar embarazada, infórmeme a su proveedor de atención médica. No lacte mientras esté tomando Ultram.

Antes de tomar el Tramadol, infórmeme a su médico si usted tiene historia médica de convulsiones, lesión en la cabeza, enfermedad hepática o renal, trastornos estomacales o depresión.

El Ultram puede ser altamente adictivo. Si usted tiene una historia médica de abuso de: drogas, medicamentos recetados o de alcohol, infórmeme a su proveedor de atención médica. Es posible que haya un medicamento diferente disponible para usted.

El Ultram puede interactuar con ciertos medicamentos, como los antidepresivos y causar graves efectos secundarios. Antes de tomar Ultram, suministre a su proveedor de atención médica una lista completa de todas las medicinas que usted usa, incluyendo vitaminas y suplementos de hierbas.

Algunos efectos secundarios del Ultram incluyen: dolor de cabeza, mareos, sensación de cansancio, náuseas, estreñimiento, diarrea, nerviosismo, comezón, sudoración y enrojecimiento.

Si usted nota cualquiera de estos efectos secundarios, contacte a su proveedor de atención médica acerca de cómo manejarlos.

Tenga en cuenta que usted está en mayor riesgo de caer mientras toma Ultram. Levántese lentamente de una posición sentada o acostada.

No conduzca, ni opere maquinaria pesada, incluyendo su auto, hasta que usted sepa cómo le afecta el Ultram.

No beba alcohol mientras usted esté tomando Ultram. Beber alcohol mientras toma Ultram puede causarle efectos secundarios graves, que provocan la muerte.

Si usted tiene alguna reacción alérgica, como: dificultad para respirar, urticaria o hinchazón de la cara o la garganta, llame al 911.

Si usted tiene convulsiones, respiración superficial, ritmo cardíaco acelerado, alucinaciones, siente que se va a desmayar, una erupción severa en la cara o en la parte superior del cuerpo, aumento de la temperatura corporal, o pérdida de la coordinación, llame al 911 y busque ayuda de inmediato.

Esta no es una lista completa de los efectos secundarios. Asegúrese de discutir todos los posibles efectos secundarios con su proveedor de atención médica.

Tome el Tramadol exactamente según lo prescrito. No modifique su dosis, ni lo tome por más tiempo de lo recetado.

Si usted está tomando el Ultram de acción prolongada, siempre trague la tableta entera con abundante agua. No divida, rompa, mastique, aplaste, disuelva o inyecte este medicamento.

El Ultram de acción prolongada debe tomarse a la misma hora todos los días. Si usted olvida una dosis, tome su Ultram tan pronto lo recuerde.

No duplique la dosis para compensar la dosis olvidada. Vuelva a su horario normal de la medicación tan pronto como sea posible.

Si usted considera que ha tomado demasiado Ultram, llame al 911. Una sobredosis de Tramadol puede causar problemas respiratorios graves que pueden conducirlo a la muerte.

Almacene el Ultram lejos de la humedad y de la luz directa del sol. Su botiquín del baño no es el mejor lugar debido a la humedad. No deje su medicamento en un lugar demasiado caliente o demasiado frío. Guarde siempre su medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños para evitar accidentes.

Debido a que el Ultram es un medicamento que puede causar dependencia, puede ser una droga muy deseable para los adictos. Guarde este medicamento bajo llave para prevenir el robo y el abuso.

Cuando haya terminado de tomar el Ultram, destruya todas las píldoras restantes y mézclelas con la basura indeseable como la arena del gato o los desechos del café.

No venda o regale el Ultram a nadie más. Es ilegal y puede dañar seriamente a cualquier otra persona que lo ingiera. Comuníquese con su estación de policía local para obtener más información sobre cómo eliminarlo adecuadamente.

El Ultram puede ayudar a aliviar su dolor. Pero es un poderoso medicamento que sólo se debe tomar exactamente según lo prescrito. Si usted tiene alguna pregunta acerca del Ultram, pregúntele a su médico o farmacéutico para obtener más información.