

Transcripción

Si usted sufre de convulsiones le pueden prescribir Dilantin. También puede estar familiarizado con su nombre genérico, Fenitoína. Dilantin es un medicamento de alerta alta, lo que significa que si usted no lo toma exactamente como se lo prescribieron, puede causarle una enfermedad o lesión.

Para entender cómo trabaja el Dilantin, veamos cómo las convulsiones se originan en su cuerpo.

Su cerebro está disparando constantemente información y mensajes al resto de su cuerpo, indicándole a usted qué pensar, qué sentir y qué hacer. Cuando usted sufre de convulsiones, su cerebro está emitiendo mensajes que están fuera de control. El Dilantin disminuye la incontrolada actividad eléctrica de su cerebro que origina las convulsiones.

El Dilantin viene en una tableta masticable, cápsula o líquido. Su proveedor del cuidado de la salud decidirá la cantidad que usted necesita tomar y la mejor forma de tomarlo.

El Dilantin es un medicamento potente. Algunas personas no deben tomarlo. No tome el Dilantin si usted es alérgico a sus ingredientes.

Si usted está embarazada o tiene intención de quedar embarazada, infórmele a su proveedor del cuidado de la salud antes de tomar el Dilantin. Un medicamento diferente puede ser más seguro para usted y su bebé. No amamante mientras esté tomando el Dilantin.

Antes de tomar el Dilantin, infórmele a su proveedor del cuidado de la salud si usted tiene una historia de: Enfermedad Hepática, problemas del corazón, problemas de Tiroides o Porfiria.

En caso de una emergencia, use un brazalete de alerta y lleve una tarjeta de bolsillo para que todos los proveedores del cuidado de la salud sepan que usted está tomando Dilantin.

Antes de tomar el Dilantin, déle a su proveedor del cuidado de la salud una lista completa de todos los medicamentos que usa, incluyendo las vitaminas y los suplementos de hierbas.

Algunos efectos secundarios del Dilantin incluyen: náuseas o vómitos, estreñimiento, temblores, dificultad para hablar, dolor de cabeza, mareos, erupciones cutáneas, problema de equilibrio, problemas oculares, alteración del gusto y problemas del sueño.

Si observa alguno de estos efectos secundarios, contacte a su proveedor del cuidado de la salud acerca de cómo manejarlos.

Tenga en cuenta que usted está en un mayor riesgo de caerse mientras esté tomando el Dilantin. Levántese lentamente de una posición sentada o acostada.

No conduzca u opere maquinaria pesada, incluyendo su auto, hasta que sepa cómo le afecta el Dilantin.

Tenga en cuenta que el consumo de alcohol mientras esté tomando el Dilantin puede aumentar ciertos efectos secundarios.

Si usted tiene una reacción alérgica como: dificultad para respirar, urticaria o hinchazón de su cara o garganta, llame al 911.

Si usted tiene: dolor de garganta, erupción en la piel, moretones con más facilidad, náuseas y vómitos, dolor de estómago, orina oscura, color amarillento en los ojos y la piel, dolor de huesos en las caderas o las piernas, reacción cutánea grave, o cambios en su estado de ánimo o comportamiento; llame a su proveedor del cuidado de la salud de inmediato.

Esta no es una lista completa de los efectos secundarios. Asegúrese de discutir todos los posibles efectos secundarios con su proveedor del cuidado de la salud.

Tome el Dilantin exactamente como se lo prescribieron. No cambie su dosis ni lo tome por más tiempo de lo recetado.

Si a usted le han prescrito el Dilantin líquido, agite bien el líquido y luego use una cucharita de dosificación o una taza medidora, para asegurarse de obtener la cantidad correcta. No use una cuchara de cocina.

Tome su medicamento a la misma hora todos los días para evitar omitir una dosis. Intente establecer una alerta en su teléfono o su reloj para que no se le olvide. Si usted olvida una dosis, tome su Dilantin tan pronto como sea posible. Si ya casi es la hora de la siguiente dosis, no tome la dosis omitida y vuelva a su horario normal de medicación.

No debe duplicar la dosis. Si usted considera que ha tomado demasiado Dilantin, llame al 911. Una sobredosis puede conducir a la muerte.

Incluso si usted se siente bien, no deje de tomar su medicamento a menos que su proveedor del cuidado de la salud se lo indique. Si deja repentinamente de tomar este medicamento usted puede tener un mayor riesgo de convulsiones.

Almacene el Dilantin lejos de la humedad y de la luz directa del sol. Su botiquín del baño no es el mejor lugar debido a la humedad.

No deje su medicamento en un lugar demasiado caliente o demasiado frío.

Siempre guarde su medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños para evitar accidentes.

Cuando usted haya terminado de tomar los comprimidos de Dilantin, destruya las pastillas restantes y mézclelas con la basura indeseable como la arena de los gatos o los desechos del café. Elimine el Dilantin líquido arrojándolo por un desagüe o el inodoro.

No venda, ni obsequie el Dilantin a nadie más. Está prohibido por la ley y puede perjudicar seriamente a cualquier otra persona que lo tome. Contacte a su estación de policía local para obtener más información sobre las instrucciones adecuadas de eliminación.

El Dilantin puede ayudarle a usted a controlar las convulsiones. Pero es un poderoso medicamento que sólo se debe tomar exactamente como se lo prescribieron. Si tiene alguna

pregunta sobre el Dilantin, consulte a su proveedor del cuidado de la salud y farmaceuta para obtener más información.