

Hysingla ER

Si usted tiene dolor de moderado o severo que no desaparece, le puede ser recetado Hysingla ER. Usted también puede estar familiarizado con el nombre genérico Hydrocodona. Hysingla ER es un medicamento de alerta alta, lo que significa que si usted no lo toma exactamente como se lo prescribieron, puede causarle una enfermedad o lesión.

Para entender cómo trabaja Hysingla ER, veamos cómo el dolor afecta a su cuerpo.

Miles de minúsculas células nerviosas en su cuerpo perciben muchas sensaciones, como el frío, el calor, la presión y el dolor. Cuando su cuerpo está lesionado, esas diminutas células nerviosas envían un mensaje a su cerebro que dice: '¡Me duele aquí!'

Hysingla ER trabaja en el cerebro modificando la forma en que su cuerpo siente y responde al dolor.

Hysingla ER es un medicamento de liberación prolongada y se prescribe para el dolor constante. No se utiliza para tratar el dolor pasajero. Hysingla ER viene en un comprimido con dosificaciones que comienzan en 10 mg y aumentan gradualmente hasta controlar su dolor. Asegúrese de entender exactamente lo que usted está tomando y cuánto se supone que debe tomar para evitar una lesión.

Hysingla ER es un medicamento potente. Algunas personas no deben tomarlo. No tome Hysingla ER si usted es alérgico a sus ingredientes.

Si usted tiene Asma, otros problemas respiratorios o una obstrucción en su estómago o intestinos, infórmele a su proveedor del cuidado de la salud.

Si usted está embarazada o planea quedarlo, hable con su proveedor del cuidado de la salud antes de tomar Hysingla ER. Puede afectar a su bebé. No amamante mientras esté tomando este medicamento.

Antes de tomar Hysingla ER, díglele a su proveedor del cuidado de la salud si usted tiene antecedentes de: problemas cardíacos; lesión en la cabeza y accidentes cerebrovasculares; enfermedad hepática o renal; o problemas de la vesícula biliar, páncreas o tiroides.

Hysingla ER puede ser altamente adictivo. Si usted tiene antecedentes de abuso de drogas callejeras, medicamentos recetados o alcohol, infórmele a su proveedor del cuidado de la salud. Puede haber un medicamento diferente disponible para usted.

Antes de tomar Hysingla ER, dele a su proveedor del cuidado de la salud una lista completa de todos los demás medicamentos que usted usa, incluyendo vitaminas y suplementos de hierbas.

Hysingla ER

Algunos efectos secundarios de Hysingla ER incluyen: estreñimiento, náuseas, resequedad en la boca, hinchazón en manos o pies, picazón, dolor muscular, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, mareos y una sensación de cansancio.

Si usted nota alguno de estos efectos secundarios, comuníquese con su proveedor del cuidado de la salud acerca de cómo manejarlos.

Tenga en cuenta que usted corre un mayor riesgo de caerse mientras toma Hysingla ER. Levántese lentamente de una posición sentada o acostada.

No conduzca ni opere maquinaria pesada, incluyendo su automóvil, hasta que usted sepa cómo lo afecta Hysingla ER.

No beba alcohol mientras esté tomando Hysingla ER. Beber alcohol mientras toma este medicamento puede causar efectos secundarios graves que conducen a la muerte.

Si usted tiene una reacción alérgica como: dificultad para respirar, urticaria, o hinchazón en su cara o garganta, llame al 911.

Si usted tiene dificultad para respirar, desorientación, dolor al orinar, cansancio extremo o siente que puede desmayarse, llame a su proveedor del cuidado de la salud de inmediato.

Esta no es la lista completa de los efectos secundarios. Asegúrese de discutir todos los posibles efectos secundarios con su proveedor del cuidado de la salud.

Tome Hysingla ER exactamente como se lo prescribieron. No modifique su dosis a menos que su proveedor del cuidado de la salud se lo indique.

Trague siempre la píldora entera con abundante agua. No corte, rompa, mastique, aplaste o disuelva este medicamento.

Hysingla ER debe tomarse a la misma hora todos los días. Es posible que usted desee establecer una alerta en su teléfono para no olvidarla.

Si usted omite una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. No duplique la dosis para compensar la dosis olvidada. Retome a su horario de medicación normal tan pronto como sea posible.

Hysingla ER

Si usted cree que ha tomado demasiado Hysingla ER, llame al 911. Una sobredosis puede causar problemas respiratorios serios que pueden conducir a la muerte.

Almacene Hysingla ER lejos de la humedad y de la luz directa del sol. Su gabinete de medicamentos del baño no es el mejor lugar debido a la humedad. No deje su medicamento donde reciba demasiado calor o demasiado frío.

Siempre guarde su medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños para prevenir accidentes.

Debido a que Hysingla ER es un narcótico que puede causar dependencia, es una droga muy deseable por los adictos. Asegure este medicamento para prevenir el robo y el abuso.

Cuando usted haya terminado de tomar Hysingla ER, destruya todos los comprimidos restantes y mézclelos con la basura indeseable como los desechos del gato o los desperdicios del café.

No venda ni obsequie Hysingla ER a nadie más. Es ilegal y puede causar daño serio a alguien más que lo tome. Comuníquese con su comisaría de policía local para obtener más información sobre las instrucciones adecuadas de eliminación.

Hysingla ER puede ayudar a aliviar su dolor. Pero es un medicamento potente que sólo se debe tomar exactamente como se lo prescribieron. Si usted tiene alguna pregunta sobre Hysingla ER, consulte a su proveedor del cuidado de la salud y farmacéuta para obtener más información.