

# Dilaudid

Si usted tiene dolor de moderado a severo, le pueden recetar Dilaudid. Usted también puede estar familiarizado con su nombre genérico, Hydromorphone. Dilaudid es un medicamento de alerta alta, lo que significa que si usted no lo toma exactamente como se lo prescribieron puede causarle una enfermedad o lesión.

Para entender cómo trabaja Dilaudid, veamos cómo el dolor afecta a su cuerpo.

Miles de minúsculas células nerviosas en su cuerpo perciben muchas sensaciones, como el frío, el calor, la presión y el dolor. Cuando su cuerpo está lesionado, estas células nerviosas envían un mensaje a su cerebro que dice: '¡Me duele aquí!'

El Dilaudid actúa en el cerebro modificando la forma en que su cuerpo siente y responde al dolor.

El Dilaudid viene en una tableta o líquido. Su proveedor del cuidado de la salud decidirá cuánto necesita tomar y la mejor forma de hacerlo, pero las tabletas vienen en dosis de 2, 4 u 8 miligramos.

El Dilaudid es un medicamento potente. Algunas personas no deben tomarlo. No tome Dilaudid si usted es alérgico a sus ingredientes.

No tome el Dilaudid si usted tiene Asma u otros problemas respiratorios.

Si usted está embarazada o planea quedarlo, hable con su proveedor del cuidado de la salud antes de tomar Dilaudid. Puede afectar a su bebé. No amamante mientras esté tomando Dilaudid.

Antes de tomar Dilaudid, infórmeme a su proveedor del cuidado de la salud si usted tiene antecedentes de: lesión en la cabeza y accidente cerebrovascular; problemas de hígado, riñón o tiroides; problemas estomacales y problemas de páncreas o de la vesícula biliar.

El Dilaudid puede ser altamente adictivo. Si usted tiene antecedentes de abuso de drogas callejeras, medicamentos con receta o alcohol, infórmeme a su proveedor del cuidado de la salud. Puede haber un medicamento diferente disponible para usted.

Algunos efectos secundarios de Dilaudid incluyen: estreñimiento, náuseas, dolor de estómago, dolor de cabeza, somnolencia, resequedad en la boca, sudoración y comezón.

Si usted nota alguno de estos efectos secundarios, pregúntele a su proveedor del cuidado de la salud cómo manejarlos.

Page 1 of 3

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.

**healthclips.**

# Dilaudid

Tenga en cuenta que usted corre un mayor riesgo de caerse mientras toma Dilaudid. Levántese lentamente de una posición sentada o acostada.

No conduzca, ni opere maquinaria pesada, incluyendo su automóvil, hasta que usted sepa cómo lo afecta el Dilaudid.

No beba alcohol mientras esté tomando Dilaudid. Beber alcohol mientras toma este medicamento puede causar efectos secundarios graves que conducen a la muerte.

Si usted tiene una reacción alérgica como: dificultad para respirar, urticaria, o hinchazón en su cara o garganta, llame al 911.

Si usted tiene: un ritmo cardíaco lento, respiración débil o superficial, dolor en el pecho, desorientación, debilidad muscular, cansancio extremo o siente que puede desmayarse, llame de inmediato a su proveedor del cuidado de la salud.

Esta no es la lista completa de los efectos secundarios. Asegúrese de discutir todos los posibles efectos secundarios con su proveedor del cuidado de la salud.

Tome Dilaudid exactamente como se lo prescribieron. No modifique la dosis, ni lo tome por más tiempo del recetado.

Trague siempre la píldora entera con abundante agua. Beba de 6 a 8 vasos de agua al día para ayudar a evitar el estreñimiento.

Si a usted le recetaron Dilaudid líquido, use una cuchara medidora o una taza de medicamento para asegurarse de que usted obtiene la cantidad correcta. No use una cuchara normal de cocina.

Si usted toma Dilaudid con regularidad y olvida una dosis, tómela tan pronto lo recuerde. No duplique la dosis para compensar la dosis olvidada. Vuelva a su horario de medicación normal tan pronto como sea posible.

Si usted cree que ha tomado demasiado Dilaudid, llame al 911. Una sobredosis de Dilaudid puede causar problemas respiratorios graves que pueden conducir a la muerte.

Almacene el Dilaudid lejos de la humedad y de la luz directa del sol. Su gabinete de medicamentos del baño no es el mejor lugar debido a la humedad. No deje su medicamento donde pueda recibir demasiado calor o demasiado frío.

Page 2 of 3

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.

**healthclips.**

# Dilaudid

Siempre guarde su medicamento lejos de la vista y del alcance de los niños para prevenir accidentes.

Debido a que el Dilaudid es un narcótico puede causar dependencia y ser una droga muy deseable por los adictos. Guarde este medicamento para prevenir el robo y el abuso.

Cuando usted haya terminado de tomar el Dilaudid, destruya todas las tabletas restantes y mézclelas con la basura indeseable como el estiércol del gato o los desechos de café. Deshágase del Dilaudid líquido arrojándolo por un desagüe o el inodoro.

No venda, ni obsequie Dilaudid a nadie más. Es ilegal y puede causar daño grave a cualquiera otra persona que lo tome. Póngase en contacto con su comisaría local de policía para obtener más información sobre las instrucciones adecuadas de eliminación.

Dilaudid puede ayudar a aliviar su dolor. Pero es un medicamento potente que solo debe ser tomado exactamente como se lo prescribieron. Si usted tiene alguna pregunta sobre el Dilaudid, pregúntele a su proveedor del cuidado de la salud y farmacéutico para obtener más información.

Page 3 of 3

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.

**healthclips.**