

# Pradaxa

Pradaxa se receta para la trombosis de vena profunda, o TVP, ésta ocurre cuando tiene, o corre el riesgo de que se le formen coágulos en las venas profundas de su cuerpo, o si tiene un problema cardíaco llamado fibrilación atrial. Es posible que conozca su nombre de marca, Dabigatran. Pradaxa es un medicamento altamente peligroso, lo que significa que si no lo toma exactamente como se lo recetan, puede causar una enfermedad o daño severo.

Para entender cómo funciona Pradaxa, veamos cómo los coágulos de sangre pueden afectar su cuerpo.

Cuando usted tiene fibrilación atrial, se puede estancar la sangre en las cámaras de su corazón y se pueden formar coágulos, lo cual podría resultar en un riesgo elevado de sufrir un ataque cerebral.

Cuando usted tiene TVP, se pueden formar coágulos en las venas profundas de su cuerpo, por lo general en las piernas, que pueden provocar problemas serios de salud.

A veces un coágulo puede romperse y viajar a través de sus vasos sanguíneos. Este se conoce por 'émbolo', este coágulo en movimiento puede viajar hacia el cerebro, el corazón o los pulmones y provocar complicaciones serias incluyendo un ataque cerebral, un ataque al corazón, dificultad para respirar, e incluso la muerte.

Pradaxa es una medicina oral que se utiliza para deshacer estos coágulos y mantener la sangre más ligera.

Su profesional médico va a decidir cuánto Pradaxa debe tomar, pero las cápsulas vienen en dosis de 75 mg, 110 mg y 150 mg. Debe asegurarse que toma la dosis correcta para evitar algún daño.

Pradaxa es un medicamento potente. Algunas personas no deben tomarlo. No tome Pradaxa si usted es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.

No tome Pradaxa si tiene sangrado activo o incontrolado.

No tome Pradaxa si tiene una válvula cardíaca artificial.

Antes de tomar Pradaxa dígale a su profesional médico si está embarazada o planea quedar embarazada, o si está amamantando. Hable con su profesional médico sobre cualquier riesgo posible para su bebé.

Antes de tomar Pradaxa, dígale a su profesional médico si tiene antecedentes de enfermedades renales o si le hacen la diálisis, si tiene úlceras estomacales o sangrado intestinal.

Debe informarles a todos sus profesionales médicos que usted está tomando Pradaxa, incluyendo a su dentista. Es posible que tenga que dejar de tomar el medicamento unos días antes de su cita.

Page 1 of 3

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.



# Pradaxa

Antes de tomar Pradaxa, dele a su profesional médico una lista completa de todos los medicamentos que utiliza, incluyendo vitaminas y suplementos de hierbas como la hierba San Juan.

Algunos medicamentos que no necesitan receta médica y que pueda estar tomando, pueden aumentar su riesgo de sangrado. Durante su tratamiento con Pradaxa debe evitar la aspirina, el ibuprofeno como Advil o Motrin, y el Naproxen como Aleve.

No tome ningún otro medicamento oral que adelgace o diluya la sangre, como la Warfarina, mientras esté tomando esta medicina.

Hable con su profesional médico sobre las opciones que tenga de medicamentos.

Durante su tratamiento con Pradaxa es posible que le hagan pruebas regulares, para ver si es efectivo y para identificar algún efecto secundario. No falte a sus citas médicas de control y de laboratorio.

El efecto secundario más serio de Pradaxa es el sangrado. Debe tener cuidado y prevenir una cortada o herida. Si tose o vomita sangre, tiene orina color rojo o tiene apariencia oxidada, tiene evacuaciones rojas, negras o con apariencia de alquitrán, o tiene dolor, inflamación o malestar en el estómago, el abdomen o en las articulaciones, llame al 911. Estas pueden ser señales de sangrado interno.

Algunos efectos secundarios comunes incluyen náusea y malestar estomacal, estreñimiento o diarrea, agruras e indigestión.

Si nota cualquiera de estos efectos secundarios, póngase en contacto con su profesional médico para saber cómo controlarlos.

Si le necesitan hacer una punción espinal o administrarle anestesia en la columna, ésto se conoce como epidural, y si toma Pradaxa, tiene más probabilidad de que se le forme un coágulo de sangre en el área de la columna. Esto puede ser serio ya que puede provocar la parálisis.

Si usted tiene una reacción alérgica como problemas para respirar, urticaria o inflamación de cara o de garganta, llame al 911.

Si tiene dolor repentino en las piernas o los pies, o se le ponen los dedos de las manos y de los pies morados, si tiene mareo inesperado, debilidad o dolor de cabeza, falta de respiración, latidos rápidos de corazón, palidez, tiene color amarillento de ojos o de piel, o si deja de orinar, llame al 911 y pida ayuda de inmediato.

Page 2 of 3

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.



# Pradaxa

Esta no es una lista completa de los efectos secundarios. Asegúrese de hablar con su profesional médico sobre todos los efectos secundarios posibles.

Tome Pradaxa exactamente como se lo hayan recetado. No cambie su dosis.

Cuando tome las cápsulas de Pradaxa, siempre debe tragar la cápsula entera con bastante agua. No corte, rompa, mastique, aplaste o disuelva este medicamento.

Pradaxa se toma generalmente dos veces al día con o sin alimento. Tome su medicamento a la misma hora diario para que no se le olvide alguna dosis.

Ponga una alarma en su teléfono o reloj para que le recuerde tomarla. Si se olvida una dosis de Pradaxa, tómela en cuánto le sea posible.

Si ya casi es hora de su próxima dosis, no se tome la dosis olvidada y regrese a su horario normal.

No tome dosis dobles. Si piensa que ha tomado demasiado Pradaxa, llame al 911.

No deje de tomar su medicamento sin consultar a su profesional médico. Si deja de tomar este medicamento, puede aumentar su riesgo de sufrir ataques cerebrales y que se formen coágulos en la sangre.

Guarde Pradaxa a temperatura ambiente, en un lugar seco y sin luz directa del sol. El botiquín en el baño no es el mejor lugar debido a la humedad.

No deje su medicamento donde pueda estar expuesto a extremos de calor o de frío.

Siempre guarde su medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños para prevenir accidentes.

Mantenga Pradaxa en su empaque original, ya sea en paquete o en envase. Si viene en un envase, debe desechar las cápsulas que no utilice, 4 meses después de haber abierto el envase.

Cuando haya terminado de tomar Pradaxa, debe consultar a su profesional médico o farmacéutico sobre la manera correcta de tirar cualquier medicina que no haya usado. No tire este medicamento en el inodoro.

Pradaxa puede reducir el riesgo de que se formen peligrosos coágulos y que tenga un ataque cerebral. Pero es un medicamento potente que se debe tomar exactamente de la manera recetada. Si tiene alguna pregunta sobre Pradaxa, consulte a su profesional médico o farmacéutico para obtener más información.

Page 3 of 3

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.

