

Rivaroxaban

Rivaroxaban se receta para la trombosis de vena profunda, o TVP, ésta ocurre cuando tiene, o corre el riesgo de que se le formen coágulos en las venas profundas de su cuerpo, o si tiene un problema cardíaco llamado fibrilación atrial. Es posible que conozca su nombre de marca, Xarelto. Rivaroxaban es un medicamento altamente peligroso, lo que significa que si no lo toma exactamente como se lo recetan, puede causar una enfermedad o daño severo.

Para entender cómo funciona Rivaroxaban, veamos cómo los coágulos de sangre pueden afectar su cuerpo.

Cuando usted tiene fibrilación atrial, se puede estancar la sangre en las cámaras de su corazón y se pueden formar coágulos, lo cual podría resultar en un elevado riesgo de sufrir un ataque cerebral.

Cuando usted tiene TVP, se pueden formar coágulos en las venas profundas de su cuerpo, por lo general en las piernas, que pueden provocar problemas serios de salud.

A veces un coágulo puede romperse y viajar a través de sus vasos sanguíneos. Este se conoce por 'émbolo', este coágulo en movimiento puede viajar hacia el cerebro, el corazón o los pulmones y provocar complicaciones serias incluyendo un ataque cerebral, un ataque al corazón, dificultad para respirar, e incluso la muerte.

Rivaroxaban es un medicamento oral usado para deshacer estos coágulos y mantener la sangre más ligera.

Su profesional médico va a decidir cuánto Rivaroxaban debe tomar, pero las pastillas vienen en presentación de 10 mg, 15 mg y 20 mg. Debe asegurarse que toma la dosis correcta para evitar algún daño.

Rivaroxaban es un medicamento potente. Algunas personas no deben tomarlo. No tome Rivaroxaban si usted es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.

No tome Rivaroxaban si tiene sangrado activo o incontrolado, tiene una válvula cardíaca artificial, o si tiene problemas renales o hepáticos.

Antes de tomar Rivaroxaban dígale a su profesional médico si está embarazada o planea quedar embarazada. Hable con su profesional médico sobre cualquier riesgo posible para su bebé.

No debe amamantar si está tomando Rivaroxaban.

Antes de tomar Rivaroxaban, dígale a su profesional médico si tiene problemas de sangrado, presión alta, anemia, ataque cerebral o úlceras estomacales.

Debe informarles a todos sus profesionales médicos que usted está tomando Rivaroxaban, incluyendo a su dentista.

Page 1 of 3

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.

healthclips.

Rivaroxaban

Es posible que tenga que dejar de tomar el medicamento unos días antes de su cita.

Antes de tomar Rivaroxaban, dele a su profesional médico una lista completa de todos los medicamentos que utiliza, incluyendo vitaminas y suplementos de hierbas como la hierba San Juan.

Algunos medicamentos que no necesitan receta médica y que pueda estar tomando, pueden aumentar el riesgo de sangrado. Durante su tratamiento con Rivaroxaban debe evitar la aspirina, el ibuprofeno como Advil o Motrin, y el Naproxen como Aleve.

No tome ningún otro medicamento oral que adelgace o diluya la sangre, como la Warfarina, mientras esté tomando esta medicina.

Hable con su profesional médico sobre las opciones que tenga de medicamentos

Durante su tratamiento con Rivaroxaban es posible que le hagan pruebas regulares, para ver si es efectivo y para identificar algún efecto secundario. No falte a sus citas médicas de control y de laboratorio.

El efecto secundario más común de Rivaroxaban es el sangrado. Debe tener cuidado y prevenir una cortada o herida. Es posible que note sangrado leve de la nariz o las encías, que tiene sangrado menstrual más abundante de lo normal y que le brotan moretones con facilidad.

Si tose o vomita sangre, tiene orina color rojo o tiene apariencia oxidada, tiene evacuaciones rojas, negras o con apariencia de alquitrán, o tiene dolor, inflamación o malestar en el estómago, el abdomen o en las articulaciones, llame al 911. Estas pueden ser señales de sangrado interno.

Otros efectos secundarios comunes incluyen mareos y dolor de cabeza, sensación de hormigueo y dolor de espalda.

Si nota cualquiera de estos efectos secundarios, póngase en contacto con su profesional médico para saber cómo controlarlos.

Si le necesitan hacer una punción espinal o administrarle anestesia en la columna, ésto se conoce por epidural, y si toma Rivaroxaban, tiene más probabilidad de que se le forme un coágulo de sangre en el área de la columna. Esto puede ser serio ya que puede provocar la parálisis.

Si usted tiene una reacción alérgica como problemas para respirar, urticaria o inflamación de cara o de garganta, llame al 911.

Page 2 of 3

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.

healthclips.

Rivaroxaban

Si tiene dolor repentino en las piernas o los pies, o se le ponen los dedos de las manos y de los pies morados, si tiene mareo inesperado, debilidad o dolor de cabeza, falta de respiración, latidos rápidos de corazón, palidez, color amarillento de ojos o de piel, o si deja de orinar, llame al 911 y pida ayuda de inmediato.

Esta no es una lista completa de los efectos secundarios. Asegúrese de hablar con su profesional médico sobre todos los efectos secundarios posibles.

Tome Rivaroxaban exactamente como se lo hayan recetado. No cambie su dosis.

Si tiene problemas para tragar la pastilla entera, pulverice la pastilla y agréguela a un vaso de agua o jugo, o un alimento blando como el puré de manzana.

Rivaroxaban se puede tomar una o dos veces al día dependiendo de su dosis. Si está tomando la dosis de 10 mg puede tomarla con o sin alimento, pero las dosis de 15mg y 20mg siempre deben tomarse con alimento. Tome su medicamento a la misma hora diario para evitar que se le olvide una dosis. Ponga una alarma en su teléfono o reloj para que le recuerde tomarla. Si se olvida una dosis de Rivaroxaban, tómela en cuánto le sea posible.

Si ya casi es hora de su próxima dosis, no se tome la dosis olvidada y regrese a su horario normal.

No tome dosis dobles. Si piensa que ha tomado demasiado Rivaroxaban, llame al 911.

No deje de tomar su medicamento sin consultar a su profesional médico. Si deja de tomar este medicamento, puede aumentar su riesgo de sufrir ataques cerebrales y que se formen coágulos en la sangre.

Guarde Rivaroxaban a temperatura ambiente, en un lugar seco y sin luz directa del sol. El botiquín en el baño no es el mejor lugar debido a la humedad.

No deje su medicamento donde pueda estar expuesto a extremos de calor o de frío.

Siempre guarde su medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños para prevenir accidentes.

Cuando haya terminado de tomar Rivaroxaban, debe consultar a su profesional médico o farmacéutico sobre la manera correcta de tirar cualquier medicamento que no haya usado. No tire este medicamento en el inodoro.

Rivaroxaban puede reducir el riesgo de que se formen peligrosos coágulos y que tenga un ataque cerebral. Pero es un medicamento potente que se debe tomar exactamente de la manera recetada. Si tiene alguna pregunta sobre Rivaroxaban, consulte a su profesional médico o farmacéutico para obtener más información.

Page 3 of 3

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.

healthclips.