

Prevención de VRE

Mientras está en el hospital, usted es vulnerable a varias infecciones, especialmente si tiene un sistema inmune comprometido. Y algunas de estas infecciones son resistentes a muchos de los antibióticos que se usan normalmente.

Es posible que haya oído hablar de S-A-R-M o MRSA: una bacteria resistente que puede provocar infecciones serias en la piel. Pero hay otra infección resistente común que empieza con la bacteria que normalmente vive en el tracto intestinal: ERV.

“ERV es otra bacteria que nos preocupa en especial. Es el nombre corto para Enterococos Resistentes a Vancomicina, este es un nombre científico elegante. Solo es otra bacteria, normalmente está en nuestros intestinos, de hecho, a veces puede salirse de ese lugar tranquilo y entrar en una infección.”

Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos y enrojecimiento en el área de la infección. Y si tuviera cualquiera de éstos, debe avisarle de inmediato a su profesional médico.

ERV se pasa de persona a persona en las manos y por superficies contaminadas.

Asegúrese que usted y todo que tenga contacto con usted, se lava o desinfecta las manos antes y después de tener contacto con usted. Pídale al personal del hospital que usen guantes nuevos.

Si tiene una sonda urinaria, pídale que la revisen a diario para asegurarse que es todavía necesaria y que se la quiten en cuánto sea seguro hacerlo.

Se puede proteger contra ERV y otras infecciones peligrosas al estar alerta de los riesgos e insistir que todos se laven las manos antes y después de haber tenido contacto con usted.