


Ecocardiografía transesofágica

La ecocardiografía transesofágica es una prueba que se realiza para registrar imágenes del corazón con una sonda dentro de la garganta (esófago). Estas imágenes ayudan al proveedor de atención médica a encontrar y tratar problemas como infecciones, enfermedades o defectos en el funcionamiento, las paredes o las válvulas del corazón. Esta prueba puede realizarse cuando un ecocardiograma torácico (transtorácico) no proporciona suficiente información a su proveedor.



Antes de la prueba

- Dígame a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que usa. Pregunte si tiene que tomar alguno antes del examen. Por lo general, debe tener el estómago vacío para esta prueba a fin de evitar vómitos, por lo que su proveedor probablemente le dirá que no los tome.
- Siga todas las indicaciones que le den sobre no comer ni beber nada antes del procedimiento.
- Informe a su proveedor si tiene úlceras, una hernia de hiato o problemas para tragar. Informe también sobre los antecedentes de estrechamiento del esófago o cualquier otro problema gastrointestinal anterior. Es posible que se necesite una sonda más pequeña para su estudio.
- Informe al proveedor sobre cualquier alergia a medicamentos o sedantes.
- También debe informarle si tiene implantes dentales o prótesis que deban retirarse antes de la prueba.
- Coordine para que alguien lo lleve de vuelta a su casa después del examen. Le administrarán un sedante para el examen. No será seguro conducir durante un periodo después del examen.

Durante la ecocardiografía transesofágica

- Cuando llegue para su ecocardiografía transesofágica, se pondrá una bata de hospital y se lo llevará a la sala de pruebas.
- El proveedor le rociará la garganta con un medicamento anestésico. Es posible que le administren un medicamento por vía intravenosa en el brazo para ayudarlo a relajarse. También es posible que le administren oxígeno. Después, le pedirán que se acueste sobre su lado izquierdo.
- El proveedor de atención médica introduce suavemente la pequeña sonda lubricada en la boca. Se le colocará un pequeño bloque de plástico o goma en la boca para evitar que muerda la sonda durante el examen. Mientras usted traga, el proveedor guiará lentamente la sonda hacia el esófago.
- Puede sentir que el proveedor de atención médica mueve la sonda. Pero esto no debería doler o interferir con su respiración. Un enfermero revisa la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. La prueba suele durar entre 15 y 30 minutos.
- El enfermero o el asistente succionarán la saliva de su boca, de forma parecida a cuando se realiza una limpieza dental.

Después de la prueba

- Infórmele a su proveedor de atención médica si siente dolor. Infórmele si tose o vomita sangre, o si tiene problemas para tragar.
- Es posible que le duela la garganta durante unas horas. Puede volver a comer y beber cuando ya no tenga la garganta adormecida y esté completamente despierto.
- No conduzca vehículos ni maneje maquinaria pesada durante al menos 24 horas después de recibir la sedación. La mayoría de las personas pueden volver a sus actividades normales después de 24 horas. Pregunte a su proveedor de atención médica cuándo es seguro que retome sus actividades normales.
- Acuda a la cita de seguimiento para repasar los resultados con el proveedor de atención médica.
- Su próxima cita es el: _____