


Timpanostomía (colocación de tubos en los oídos)

La timpanostomía es un tipo de cirugía del oído. En esta, se coloca un tubo muy pequeño en el tímpano. El tubo drena el líquido que se acumula y equilibra la presión del aire en los dos lados del tímpano. Este procedimiento puede utilizarse para tratar infecciones crónicas del oído o acumulación de líquido que disminuye la audición.



Antes del procedimiento

- A menos que le digan lo contrario, no le dé a su hijo comidas ni bebidas por lo menos 4 horas antes de la hora programada para presentarse. Pregunte la hora exacta en el consultorio del cirujano.
- Le harán una exploración física. Le medirán la fiebre para descartar cualquier infección activa. Esto podría hacer que se postergue la cirugía.
- Al llegar, es posible que le den a su hijo un medicamento (un sedante suave) para ayudar a que se relaje.
- A usted, como parente, madre o tutor legal, le darán un formulario de consentimiento para que lo firme después de que el proveedor de atención médica le haya explicado el procedimiento. Asegúrese de evacuar todas sus dudas antes de firmarlo.

Durante el procedimiento

- Probablemente, le administrarán anestesia general. El niño estará dormido y no sentirá ningún dolor durante la cirugía.
- Se abre una pequeña ranura en el tímpano (timpanostomía) usando un microscopio quirúrgico e instrumentos quirúrgicos especiales.
- Con un tubo de succión se aspira suavemente a través de la ranura en el tímpano el líquido que se haya acumulado. En algunos casos, se envía al laboratorio una

muestra del líquido para ver si todavía hay infección.

- Se coloca un tubo muy pequeño en la misma ranura del tímpano (timpanostomía). Una vez colocado, la forma del tubo facilita que se quede en su sitio. Los tubos pueden ser de metal o de plástico. Varían ligeramente en cuanto al tamaño y la forma.

Después del procedimiento

- Dentro de la media hora siguiente, su hijo se despertará. Cuando vaya a verlo, no se alarme si está molesto. La anestesia puede disminuir el autocontrol. Esto hace que algunos niños lloren o griten.
- Su hijo podrá regresar a casa una vez que se calme lo suficiente como para poder sentarse y beber.
- En casa, asegúrese de ponerle las gotas para el oído o darle otros medicamentos según las instrucciones del proveedor de atención médica.
- Vaya a todas las citas de seguimiento según se hayan programado.

Cuándo llamar al proveedor de atención médica de su hijo

Llame al proveedor de atención médica de su hijo si el niño presenta cualquiera de los siguientes signos o síntomas:

- El oído sangra mucho o sigue sangrando después de las primeras 48 horas.
- Se drena un líquido pegajoso o descolorido después de las primeras 48 horas.
- Su hijo tiene fiebre (consulte "La fiebre y los niños", a continuación).
- Ha tenido convulsiones causadas por la fiebre.
- Está mareado, confuso, muy adormilado o sufre cambios en su estado mental.

La fiebre y los niños

Use un termómetro digital para tomar la temperatura de su hijo. No use un termómetro de mercurio. Existen distintos tipos de termómetros digitales. Pueden ser para la boca, el oído, la frente (temporal), el recto o la axila. La temperatura tomada en el oído no es precisa antes de los 6 meses de edad. No tome la temperatura por boca hasta que su hijo tenga, por lo menos, 4 años.

Use el termómetro rectal con cuidado. Este puede perforar el recto accidentalmente. Podría transmitir gérmenes de las heces. Siga las instrucciones del fabricante del producto para usarlo de forma adecuada. Si no se siente cómodo usando un termómetro rectal, use uno de otro tipo. Cuando hable con el proveedor de atención médica de su hijo, infórmele qué tipo usó.

A continuación, encontrará valores de referencia que lo ayudarán a saber si su hijo tiene fiebre. Es posible que el proveedor de atención médica de su hijo le dé valores diferentes.

Bebé menor de 3 meses:

- Primero, pregunte al proveedor de atención médica de su hijo cómo debe tomarle la temperatura.
- En el recto o en la frente: 100.4 °F (38 °C) o superior
- En la axila: 99 °F (37.2 °C) o superior

Niño de 3 a 36 meses (3 años):

- En el recto, la frente o el oído: 102 °F (38.9 °C) o superior
- En la axila: 101 °F (38.3 °C) o superior

Llame al proveedor de atención médica en los siguientes casos:

- Picos de fiebre reiterados de 104 °F (40 °C) o más
- Fiebre que dura más de 24 horas en un niño menor de 2 años
- Fiebre que dura 3 días en un niño de 2 años o más