


Operación de amígdalas y adenoides

A su hijo lo van a operar para extraerle las amígdalas o las adenoides. Si es necesario, lo podrían extraer ambas en la misma cirugía. A continuación se describen estos 2 procedimientos.



Amigdalectomía

Es una cirugía para extraer las amígdalas. Las amígdalas son 2 pequeñas masas de tejido que ayudan al cuerpo a combatir enfermedades. Se encuentran en la parte de atrás de la garganta, detrás y por encima de la lengua. Las amígdalas se pueden ver fácilmente. Esta cirugía puede llevarse a cabo si se agrandan demasiado y dificultan la respiración. También puede llevarse a cabo si las amígdalas se infectan con frecuencia.

Adenoidectomía

Es una cirugía para extraer las adenoides. La palabra “adenoide” se refiere a una única masa de tejido que ayuda al cuerpo a combatir enfermedades. Esta masa se encuentra detrás de la nariz y la parte superior de la garganta. Está cerca del conducto que lleva al oído medio (trompa de Eustaquio). Queda oculta detrás del paladar blando. Esta cirugía puede necesitarse si el tejido agrandado de las adenoides dificulta la respiración. También puede realizarse si el tejido de las adenoides se infecta y provoca infecciones de oído.

La extracción de las amígdalas y adenoides es una de las cirugías más comunes. Su extracción no implica que el cuerpo tenga dificultades para combatir infecciones.