


Prolapso de órganos pélvicos: cirugía para el cistocele

El cistocele se presenta cuando la vejiga entra en la vagina (prolapsa). El objetivo de la cirugía es corregir ese problema. Esto alivia los síntomas. La cirugía puede incluir una o más reparaciones.



El procedimiento quirúrgico

El cistocele se puede tratar con una cirugía que se hace por la vagina. La vejiga que cuelga se vuelve a colocar en su posición normal. Se hacen puntos en el tejido que separa la vejiga de la vagina. En ocasiones, se usa un injerto o una malla para sostener la reparación y mantener la vejiga en su lugar. Pregúntele al cirujano si van a usar malla y cuáles son los riesgos. En algunos casos, se hace otro tipo de cirugía. Puede ayudar a corregir la debilidad en la pared anterior de la vagina. La vagina se une a tejidos fuertes en la pared lateral de la pelvis.

Posibles riesgos y complicaciones de esta cirugía

- Infección
- Sangrado
- Riesgos relacionados con la anestesia
- Daño a los nervios, músculos o estructuras pélvicas cercanas
- Coágulos de sangre
- Repetición del prolapso de uno o más órganos pélvicos
- Dolor vaginal o al tener relaciones sexuales
- Infección urinaria

- Incontinencia de urgencia
- Retención urinaria
- Fístula. Es una conexión anormal entre la vejiga y la vagina.
- Formación de un saco o bolsa en la uretra (divertículo uretral)