


# Acceso para el catéter de DP: colocación del catéter

Sus riñones filtran y eliminan los desechos de su sangre. Cuando fallan, hay que encontrar otra manera de desempeñar esta función. La diálisis peritoneal (**DP**) es un tratamiento que puede hacerse cargo del trabajo que los riñones ya no realizan. El peritoneo es la membrana que recubre el interior de su abdomen. La DP emplea el revestimiento del abdomen (el peritoneo) para filtrar la sangre. Para que pueda efectuarse este tratamiento, hace falta crear una entrada a este revestimiento (un **acceso**). El acceso para la DP es un tubo blando llamado **catéter** que se le implanta en el abdomen.



## Colocación del catéter

- Una enfermera o anestesiólogo le dará medicamentos para que usted no sienta ningún dolor durante la operación.
- Le harán una pequeña abertura justo debajo del ombligo, por donde se colocará el catéter.
- Uno de los extremos del catéter está dentro del abdomen. El otro extremo sobresale varios centímetros por un **sitio de salida** creado en la piel, el cual se sella con una pinza y se tapa cuando no se está utilizando.
- Por lo general, una parte del catéter pasa por una especie de túnel que se hace debajo de la piel antes de ingresar en su abdomen. Este túnel ayuda a impedir que las infecciones puedan entrar en su abdomen y, además, sujetta el catéter para evitar que se caiga.