


Tratamiento de cálculos renales: extracción de cálculos renales mediante ureteroscopia

La extracción ureteroscópica de los cálculos puede hacerse antes, después o en lugar de otros tratamientos. Si necesita este procedimiento, el proveedor de atención médica hablará con usted sobre sus riesgos y posibles complicaciones. Le dirán cómo prepararse. También le darán información sobre el tipo de anestesia que recibirá. Esto evitará que sienta dolor durante el tratamiento.

Extracción del cálculo a través del uréter

En la extracción de cálculos renales mediante ureteroscopia, se extrae un pequeño cálculo en el uréter. Esto se hace sin una incisión. El uréter es el conducto por el que pasa la orina desde el riñón a la vejiga. El proveedor de atención médica coloca un tubo de observación (ureteroscopio) en el uréter. A través del tubo se inserta una pequeña canastilla de alambre con la cual se extrae el cálculo. En algunos casos, se utiliza un láser o un dispositivo mecánico para romper el cálculo. Es posible que se deje un tubo blando en el uréter por poco tiempo para drenar la orina.



Su recuperación

Es posible que regrese a casa el mismo día o que deba permanecer una noche en el hospital. Durante algunos días después de la cirugía, es posible que sienta algún dolor al orinar. También puede sentir la necesidad de orinar con más frecuencia o tener sangre en la orina. Puede tener un stent ureteral. Es un tubo blando que evita que la hinchazón de la zona afectada obstruya (bloquee) el paso de la orina después del procedimiento. El stent se quita cuando se reduce la hinchazón, normalmente a los pocos días. Siga las instrucciones del que recibió para revisar la presencia de nuevos cálculos.

Cuándo llamar al proveedor de atención médica

Llame de inmediato al proveedor de atención médica en los siguientes casos:

- Tiene un dolor repentino o de costado
- Tiene fiebre de más de 100.4 °F (38 °C) o según lo que le indique el proveedor de atención médica
- Tiene náuseas por más tiempo del indicado en las instrucciones del alta
- Sangra mucho al orinar
- Sangra mucho por el tubo de drenaje
- Se hinchó o enrojeció la zona alrededor de la incisión