

# Traumatismo dental

Los dientes o la boca pueden lesionarse (sufrir un traumatismo) debido a un accidente o durante la práctica de deportes. El traumatismo dental no siempre puede parecer grave. Pero hasta las lesiones menores pueden provocar infecciones u otros problemas. La clave para conservar su sonrisa radica en buscar ayuda de inmediato.



## Cuándo acudir a la sala de emergencias

Para la mayoría de los traumatismos dentales, es de vital importancia actuar sin demora. Cuanto más pronto se reciba tratamiento, mayores serán las probabilidades de salvar los dientes lesionados. Vaya de inmediato al dentista o a la sala de emergencias en las siguientes situaciones:

- Se parte uno o más dientes.
- Pierde uno o más dientes a causa de un golpe.
- Tiene una cortada en el labio o en la lengua que no deja de sangrar.
- Después de una lesión, sus dientes ya no se alinean correctamente cuando muerde.

## Qué debe hacer si se le salió un diente debido a un golpe

Si se le salió un diente debido a un golpe:

- Agarre el diente por la parte superior (la corona o la superficie que permite masticar) y no por las raíces.
- Mantenga el diente húmedo en todo momento. Coloque el diente en un vaso de leche o colóquelo en un producto de conservación odontológico que tenga el sello de aprobación de la Asociación Dental Americana (American Dental Association, ADA). Esto impide que el diente se seque. No coloque el diente en agua corriente. Esto puede dañar las células de la raíz del diente.
- Busque atención médica de inmediato de su dentista o en la sala de emergencias.

## Qué sucederá en la sala de emergencias

Le examinarán la herida. Si ha perdido un diente, es posible que un dentista logre reimplantárselo. Para obtener resultados óptimos, esto debe hacerse en la hora siguiente a la lesión. En muchos casos, también se puede reparar un diente partido. Las cortadas y raspaduras pueden tratarse con compresas frías y apósitos. Probablemente se tomará una radiografía para verificar el grado del daño y descubrir si hay o no una fractura de las raíces de los dientes.

## **Cuándo llamar a su proveedor de atención médica**

Una vez que esté en su casa, llame a su dentista enseguida si:

- Tiene fiebre de 100,4° F ( 38 °C) o más alta, o según le indique su dentista
- Tiene secreciones en la zona de un diente reparado
- Tiene dolor que empeora después de 24 horas
- Continúa sangrando