
Instrucciones de alta después de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica

Se le practicó una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). Su proveedor de atención médica le practicó la CPRE para revisarle los conductos biliares o pancreáticos con el objetivo de localizar y tratar las obstrucciones en estos conductos. Este procedimiento se usa para diagnosticar enfermedades del páncreas, los conductos biliares y pancreático, el hígado y la vesícula. Esto es lo que debe hacer después de su CPRE.

Cuidados en el hogar

- No tome aspirina ni otros medicamentos que diluyan la sangre (anticoagulantes) hasta que su proveedor de atención médica le diga que puede hacerlo.
- Es posible que su proveedor le recete un antibiótico, según lo que se haya hecho durante la CPRE.
- Puede tener dolor de garganta durante 1 a 2 días después del procedimiento. Para aliviar el dolor de garganta, tome pastillas para la tos o haga gárgaras con agua salada. Si no mejora en unos días, llame a su proveedor de atención médica.
- Descanse, tome líquidos y consuma comidas livianas. Si tiene sensación de distensión o gases en exceso, use una almohadilla calefactora en su abdomen para disminuir la incomodidad. Esto debería ayudarlo a sentirse mejor. Si no es así, asegúrese de comunicarse con su proveedor de atención médica.
- No tome bebidas alcohólicas durante 2 días después del procedimiento.
- No conduzca durante las siguientes 24 horas después del procedimiento.
- Siga las indicaciones del proveedor de atención médica sobre cuándo puede reanudar su rutina.

Atención de seguimiento

Programe una cita de seguimiento según le indique nuestro personal.

Cuándo llamar al proveedor de atención médica

Llame al proveedor de atención médica de inmediato ante cualquiera de los siguientes signos o síntomas:

- Heces de color negruzco o muy oscuro
- Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior, o según lo que le haya indicado el proveedor de atención médica
- Escalofríos
- Dificultad para tragar o dolor en la garganta que empeora

-
- Malestar estomacal (náuseas) y vómitos

Llame al 911 si tiene dolor de pecho o dolor abdominal grave