

# Instrucciones de alta: cómo cuidar el vendaje Transcyte

Se está yendo a casa con un vendaje Transcyte. Este vendaje se usa para cubrir una quemadura de segundo o tercer grado. Este tipo de vendaje reduce la necesidad de cambios de vendaje. Permanecerá puesto para proteger la herida mientras se sana. Usted puede hacer la mayoría de sus actividades normales con el vendaje Transcyte puesto en la herida. Pero no debe bañarse en tina ni sumergirlo en el agua. La siguiente es información que necesita conocer.

## ¿Qué sucederá?

- El vendaje es transparente.
- Cuando vaya sanando la piel, el vendaje Transcyte parecerá costoso. Le puede causar picazón.
- Al cabo de 7 a 14 días después de haber sido colocado, el vendaje comienza a desprenderse por las orillas.

## Cuidado de la herida

- No quite el apósito de gasa que está encima del vendaje Transcyte durante 24 a 72 horas después de que se lo hayan puesto.
- Limite el movimiento en la zona donde está el vendaje Transcyte durante las próximas 48 horas para que se adhiera.
- Una vez quitada la gasa, puede volver a hacer la mayoría de sus actividades normales.
- Báñese a diario en la ducha, pero no se sumerja en la tina:
  - Use una toallita limpia para lavar el vendaje Transcyte con cuidado. No lo frrote.
  - Enjuague bien el vendaje.
  - Séquese y use otra toalla limpia para secar con toques suaves el vendaje Transcyte. Si lo desea, use un secador de pelo con aire frío para secar el vendaje.
- Revise la herida para detectar signos de infección, como enrojecimiento, hinchazón, secreción de líquidos u olor desagradable.
- Cuando se empiece a desprender el vendaje Transcyte y la herida empiece a sanar, corte las orillas desprendidas. Use unas tijeras que haya limpiado con un hisopo con alcohol. Pare de cortar si es doloroso o si comienza a sangrar.
- Aplique loción o crema humectante en las partes donde cortó las orillas del vendaje Transcyte.
- No cubra el vendaje con otros apósitos. No necesita preocuparse por que se caiga.

# Seguimiento

Programe una cita de seguimiento o según le indique el proveedor de atención médica.

## Cuándo llamar al proveedor de atención médica

Llame al proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de estos síntomas:

- Aumento del enrojecimiento, de la hinchazón o del calor en la piel alrededor de la herida
- Líquido que se acumula debajo del vendaje Transcyte
- Olor desagradable proveniente de la herida
- Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior, o según le haya indicado el proveedor
- Escalofríos
- Aumento del dolor
- Sangrado