

La enfermedad periodontal: Si necesita cirugía

Si tiene enfermedad periodontal, quizás necesite un tratamiento quirúrgico para salvar uno o más dientes. Mediante una cirugía es posible reducir el tamaño de las bolsas que se forman entre el diente y la encía. Además, puede ayudar a regenerar hueso y otros tejidos o ajustar el borde de las encías. La cirugía también puede usarse para llegar al sarro que no se puede eliminar de otra manera.

Durante la cirugía

La cirugía periodontal se realiza en el consultorio del dentista. Podrá regresar a su casa poco después de que finalice. Le administrarán anestesia local para controlar el dolor. Esta adormece las zonas sobre las cuales se trabajará. También podrían darle medicamentos para ayudarlo a relajarse (un sedante). Antes de la cirugía, asegúrese de conseguir a alguien que lo lleve a casa. Como parte del proceso, se hace un corte. Luego se empuja la encía. Esto permite el acceso para extraer el sarro y las bacterias. Y también permite reformar el hueso. Se hacen puntos (sutura) después de esa limpieza para cerrar el corte. Es posible que se coloque un vendaje en forma de masilla para proteger el sitio de la cirugía durante la curación.

Después de la cirugía

Podrían darle las siguientes instrucciones justo después de la cirugía:

- Descansar por 1 a 2 días
- Tomar medicamentos para controlar el dolor o prevenir infecciones
- Aplicarse hielo o tomar medicamentos para controlar la hinchazón
- Abstenerse de fumar
- Limpiables los dientes siguiendo instrucciones especiales
- Cuidarse la zona operada o el vendaje



Tendrá una visita de seguimiento entre 1 y 3 semanas después para evaluar su recuperación. Le quitarán los puntos y el vendaje (material que cubre y protege la herida).

Riesgos y posibles complicaciones

Pueden variar según el motivo de la cirugía. En general, pueden incluir lo siguiente:

- Dolor o molestias
- Mayor movilidad o sensibilidad de los dientes (que suele ser temporal)
- Hinchazón y magulladuras en la mejilla
- Adormecimiento y hormigueo debido a daños pasajeros o permanentes de los nervios cercanos
- Exposición de una mayor parte de la corona o raíz

Cuándo debe llamar al dentista

Llame al dentista de inmediato después de la cirugía si presenta cualquiera de los siguientes signos o síntomas:

- Tiene sangrado o hinchazón excesivos
- Los puntos se deshacen antes del tiempo previsto que le indicó el cirujano
- El vendaje se desprende en parte o en su totalidad, o le causa molestias
- Tiene un dolor que no se alivia con los medicamentos
- Tiene fiebre de 100.4 ° F (38 °C) o superior, o según le indique el dentista
- Tiene preguntas sobre su afección o tratamiento