

Cuándo debe llamar al médico después de una cirugía de derivación

Llame a su equipo de atención médica si presenta cualquiera de estos síntomas:

- Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior, o según lo que le indique el proveedor de atención médica
- Escalofríos o sudoración sin motivo aparente
- Dolor agudo de pecho cuando inspira profundo
- Sangrado de las incisiones
- Dolor abdominal, náuseas, estreñimiento o vómitos que no desaparecen
- Dolor que va en aumento y que no se alivia con los medicamentos
- Hinchazón, enrojecimiento, supuración o secreción turbia en la herida
- Moretones de causa desconocida
- Sigue sintiendo sensación de movimiento o chasquidos en el esternón
- Aumento de peso repentino (informe al proveedor de atención médica si aumenta de 1/2 kg a 1 kg [de 1 a 2 libras] en 24 horas o más o 2 kg [5 libras] o más en una semana)
- Aumento de la hinchazón en las piernas, en especial del lado que no se extrajo la vena
- Supuración o mal olor proveniente de las incisiones en el pecho o la pierna



Cuándo llamar al 911

Llame al 911 de inmediato ante cualquiera de los siguientes síntomas:

- Falta de aliento o dificultades para respirar que no se alivian con el descanso
- Angina o dolor de pecho
- Dolor de cabeza intenso y repentino
- Debilidad y entumecimiento repentinos en la cara, los brazos o las piernas, o dificultad para hablar
- Mareos o desmayos
- Ritmo cardíaco acelerado, demasiado lento o irregular