


# ¿Qué es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado?

El bloqueo auriculoventricular es una afección por la cual el sistema eléctrico del corazón no funciona correctamente. A menudo puede hacer que la frecuencia cardíaca sea lenta, ya sea regular o irregular. Es posible que no se manifiesten síntomas.

Cuando se presenta un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, las cavidades superiores del corazón laten con normalidad, pero las señales eléctricas no se retransmiten de las cavidades superiores del corazón (aurículas) a las cavidades inferiores (ventrículos). Es posible que el sistema de señales de las cavidades inferiores asuma el control como forma de apoyo, pero esto no funciona bien porque la frecuencia normal de los ventrículos es mucho más lenta. Las personas que tienen un bloqueo auriculoventricular de tercer grado generalmente tienen latidos muy lentos. Como el corazón late con tanta lentitud, no logra hacer circular bien la sangre por todo el cuerpo. Las personas que tienen bloqueo auriculoventricular suelen presentar síntomas.

El bloqueo auriculoventricular de tercer grado a veces se conoce como bloqueo cardíaco completo.



## ¿Cuáles son las causas de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado?

Un bloqueo cardíaco de tercer grado puede deberse a lo siguiente:

- Daño en el corazón a causa de una cirugía
- Daño al músculo del corazón debido a un ataque cardíaco
- Otros tipos de enfermedades del corazón que traen como consecuencia daño al músculo del corazón
- Enfermedad de las válvulas cardíacas
- Otras enfermedades, por ejemplo, fiebre reumática y sarcoidosis

- Algunos medicamentos
- Edad avanzada

Además, algunos bebés nacen con un bloqueo auriculoventricular. Esta afección también puede ser hereditaria.

## **¿Cuáles son los síntomas del bloqueo auriculoventricular de tercer grado?**

Entre los síntomas del bloqueo auriculoventricular de tercer grado se encuentran los siguientes:

- Aturdimiento, desmayo o mareo
- Cansancio
- Falta de aire

## **¿Cómo se trata el bloqueo auriculoventricular de tercer grado?**

El bloqueo auriculoventricular de tercer grado es una afección grave que necesita tratamiento inmediato. Los tratamientos para el bloqueo auriculoventricular de tercer grado incluyen lo siguiente:

- Tomar medicamentos para subir la frecuencia cardíaca en el corto plazo
- Dejar de tomar medicamentos, si son los causantes del bloqueo auriculoventricular
- Colocar un marcapasos

## **¿Cuáles son las posibles complicaciones del bloqueo auriculoventricular de tercer grado?**

Este bloqueo puede causar una pérdida repentina del conocimiento. Además, puede provocar que el corazón deje de latir súbitamente (paro cardíaco repentino).

## **Cuándo debe llamar al proveedor de atención médica**

Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si nota alguno de los siguientes síntomas:

- Cansancio inusual
- Falta de aire
- Dolor en el pecho
- Debilidad, mareo o desmayo
- Somnolencia inusual o confusión

- Dolor que empeora
- Síntomas que no mejoran con el tratamiento o que empeoran
- Síntomas nuevos