

Instrucciones de alta: el regreso a casa con un stent biliar

Tiene un stent biliar colocado. Es un tubo delgado y flexible que se coloca en el conducto biliar entre el hígado y el intestino. La bilis es un líquido que facilita la digestión de los alimentos. Un stent se usa para tratar un conducto biliar obstruido. Ayuda a que la bilis fluya como debería.

Cómo se pronuncia

Bi-LIAR

En el hogar

El stent se colocó durante un procedimiento llamado colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP, por su sigla en inglés) o ecoendoscopia (EUS, por su sigla en inglés). Después del procedimiento, descanse según sea necesario. Tanto la ERCP como la EUS se hacen mediante un tubo (endoscopio) que se introduce por la garganta. Es posible que tenga dolor de garganta durante unos días. El stent se puede colocar desde el exterior del cuerpo, durante un procedimiento de colangiografía biliar percutánea (PTC, por su sigla en inglés).

En algunos casos, el stent puede moverse. O, con el tiempo, puede obstruirse. Si esto sucede, puede causar síntomas como los siguientes:

- Piel u ojos de color amarillo (ictericia)
- Dolor en la parte superior derecha del abdomen
- Fiebre
- Sensación de malestar estomacal (náuseas)
- Vómitos
- Heces color marrón claro o color arcilla y orina muy oscura
- Muchos gases
- Dolor en la espalda debajo del hombro derecho

Llame al equipo de atención médica si presenta cualquiera de estos síntomas.

El proveedor le dirá si el stent debe retirarse en el futuro, en otro procedimiento.

Cuándo llamar al proveedor de atención médica

Llame al proveedor de atención médica de inmediato ante cualquiera de los siguientes casos:

- Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior, o según lo que le haya indicado el proveedor

- Síntomas de problemas con el stent (ver arriba)
- Heces negras o pegajosas