

Humulina N

Tu profesional médico puede recetarte Humulin N para ayudar a controlar tu diabetes.

Teniendo diabetes, tu cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza correctamente.

Aplicando Humulina N, mantienes tu nivel de glucosa dentro de un rango sano.

Viene en botella o pluma precargada.

Humulina N es una insulina de Acción Intermedia. Esto significa que empieza a surtir efecto de 2-4 horas y puede continuar hasta 24 horas después, dependiendo de tu dosis y otros factores.

Un posible efecto secundario de Humulina N inyectada es nivel bajo de glucosa o hipoglicemia.

El nivel bajo de glucosa es un efecto secundario serio que puede causar: dolor de cabeza, debilidad, sudor frío o sensación de humedad, temblores, hambre, pulso rápido, irritabilidad, cambios de visión, mareos y confusión.

Si ignoras la hipoglicemia puede empeorar y podrías desmayarte

Consulta a tu profesional médico sobre la mejor manera de enfrentar la hipoglicemia y siempre ten a la mano un carbohidrato de acción rápida como pastillas o gel de glucosa, que encuentras en cualquier farmacia.

Otros efectos secundarios posibles de Humulina N incluyen: inflamación de manos y pies, reacción alérgica, y enrojecimiento, inflamación o comezón en el área de la inyección.

Habla con tu profesional médico sobre la lista completa de efectos secundarios, antes de tomar Humulina N.

Antes de usar Humulina N, avísale a tu profesional médico si tienes problemas de hígado o de riñones. Tal vez deban ajustar tu dosis.

Muéstrale a tu profesional médico una lista completa de todos los medicamentos que uses. Algunos medicamentos pueden dificultar determinar si tienes nivel bajo de azúcar y pueden aumentar tu riesgo de problemas cardíacos serios, incluso insuficiencia cardíaca.

Consulta a tu profesional médico sobre cuánta Humulina N debes tomar y la mejor manera de hacerlo. Checa tu nivel de glucosa de la manera indicada antes de aplicar insulina.

Humulina N se debe mezclar antes de su uso. Suavemente rueda la botella entre tus manos y gírala de extremo a extremo para mezclarla completamente. No la agites.

Ya sea que utilices una jeringa o una pluma de insulina, se debe inyectar Humulina N en el tejido graso, debajo de la piel.

Cambia la zona utilizando un patrón regular como de un reloj. Esto ayuda a mantener la piel y el tejido subcutáneo sanos.

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.



Humulina N

Guarda la Humulina N que tengas sin abrir en el refrigerador. Pero nunca en la puerta, la temperatura puede cambiar cada vez que abras el refrigerador.

No es necesario refrigerar la Humulina N que esté en uso, pero se debe usar antes de 28 días de haberla abierto. No utilices Humulina N si la pluma o la botella han caducado.

Nunca guardes insulina en un lugar demasiado frío o caliente.

Y nunca utilices Humulina N que no se mezcle con facilidad o tenga apariencia de grumos.

Si tienes preguntas sobre Humulina N, pídele a tu profesional médico o farmacéutico más información.

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.

