

Insulina Humulina U-500

Tu profesional médico puede recetar Humulina U-500 para ayudar a controlar tu diabetes.

Teniendo diabetes, tu cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza correctamente.

Aplicando Insulina Humulina U-500 mantienes tu nivel de glucosa dentro de un rango sano.

Si aplicas más de 200 unidades de insulina diario, tal vez tu profesional médico te recete Insulina Humulina U-500.

Insulina Humulina U-500 es un concentrado de insulina. Empieza a surtir efecto a los 30 minutos. Trabaja con más fuerza de 2 a 4 horas después y tiene una duración de 24 horas.

Un posible efecto secundario de Insulina Humulina U-500 es nivel bajo de glucosa o hipoglicemia.

Debido a que la Insulina Humulina U-500 empieza a bajar rápidamente tu nivel de glucosa, debes estar preparado para comer antes de 30 minutos de haberla aplicado.

Ya que tu nivel de glucosa podría bajar demasiado.

El nivel bajo de glucosa es un efecto secundario serio que puede causar: dolor de cabeza, debilidad, sudor frío o sensación de humedad, temblores, hambre, pulso rápido, irritabilidad, cambios de visión, mareos y confusión.

Si ignoras la hipoglicemia puede empeorar y podrías desmayarte.

Consulta a tu profesional médico sobre la mejor manera de enfrentar la hipoglicemia y siempre ten a la mano un carbohidrato de acción rápida como pastillas o gel de glucosa, que encuentras en cualquier farmacia.

Otros efectos secundarios posibles de Insulina Humulina U-500 incluyen: reacción alérgica; y enrojecimiento, inflamación o comezón en el área de la inyección.

Habla con tu profesional médico sobre la lista completa de efectos secundarios.

Antes de usar Insulina Humulina U-500, avísale a tu profesional médico si tienes problemas de hígado o de riñones. Tal vez deban ajustar tu dosis.

Debes mostrarle a tu profesional médico una lista completa de todos los medicamentos que tomes. Tomar algunos medicamentos mientras usas insulina, pueden dificultar saber cuándo tienes un nivel bajo de glucosa y aumentar tu riesgo de problemas cardíacos serios.

Consulta a tu profesional médico sobre cuánta Insulina Humulina U-500 debes tomar y la mejor manera de hacerlo. Checa tu nivel de glucosa de la manera indicada antes de aplicar insulina.

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.



Insulina Humulina U-500

Debido a que la Insulina Humulina U-500 es concentrada, es muy importante medir correctamente la dosis. Aún una pequeña cantidad podría provocar efectos secundarios serios. Debes saber si tu dosis correcta está en unidades o mililitros y asegurarte que coincide con las medidas de tu jeringa.

Siempre usa la misma marca y tipo de jeringa para que no tengas dudas al inyectar tu dosis. Si tuvieras alguna pregunta, consulta a tu profesional médico.

La Insulina Humulina U-500 debe ser aplicada en el tejido graso, debajo de la piel.

Cambia la zona utilizando un patrón regular como de un reloj. Esto ayuda a mantener la piel y el tejido subcutáneo sanos.

Guarda cualquier Insulina Humulina U-500 que tengas sin abrir en el refrigerador. Pero nunca en la puerta, pues la temperatura puede cambiar cada vez que abras el refrigerador.

No es necesario refrigerar Insulina Humulina U-500 que esté en uso, pero se debe usar antes de 28 días de haberla abierto. No utilices Insulina Humulina U-500 si la pluma o la botella han caducado.

Nunca guardes insulina en un lugar demasiado frío o caliente, o bajo luz directa del sol.

Y nunca utilices Insulina Humulina U-500 que esté amarilla o turbia.

Si tienes alguna pregunta sobre la Insulina Humulina U-500, consulta a tu profesional médico o farmacéutico para más información.

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este video como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.

