

Nateglinida

Tal vez te receten Nateglinida si tienes diabetes tipo 2.

Para ver cómo funciona esta medicina, veamos lo que sucede cuando comes.

Cuando comes, tu cuerpo convierte la mayoría del alimento en glucosa, una forma de azúcar, y libera hormonas que van hacia el páncreas.

La glucosa entra en el torrente sanguíneo provocando que se eleve el nivel de glucosa o azúcar.

Como reacción a esta elevación de glucosa y liberación de hormonas, el páncreas libera insulina.

La insulina funciona como una llave que abre las células y permite que entre la glucosa.

La glucosa se usa como energía en ese momento o se almacena en el cuerpo para utilizarse más tarde.

En muchas personas con Diabetes Tipo 2, el páncreas no libera insulina suficientemente rápido una vez que empiezan a comer.

La glucosa de tu comida se acumula en el torrente sanguíneo, causando nivel alto de azúcar en sangre.

Cuando tomas Nateglinida, tu páncreas libera insulina más rápido una vez que empiezas a comer.

Con la insulina, tus células se pueden abrir y aceptar la glucosa.

Esto la elimina del torrente sanguíneo y baja tu nivel de azúcar en sangre.

Debido a que esta medicina funciona con el alimento que comes, es mejor si la tomas 30 minutos antes de tus comidas.

Existe la pequeña posibilidad de tener hipoglucemia, también llamada nivel bajo de azúcar en sangre con esta medicina.

Otros efectos secundarios incluyen infecciones respiratorias, mareos y diarrea.

Antes de tomar Nateglinida, debes darle a tu doctor una lista completa de todos los medicamentos que usas.

Algunas podrían interactuar con Nateglinida.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Nateglinida

Almacena Nateglinida a temperatura ambiente, en un lugar seco y sin luz directa.

Manténla alejada de la vista y del alcance de los niños.

Si tu y tu equipo médico notan que tu nivel de azúcar se eleva normalmente a niveles más altos de tu meta después de comer, tal vez te beneficie Nateglinida.

Toma Nateglinida exactamente de la manera recetada.

Si tienes alguna duda sobre Nateglinida, pídele a tu doctor o farmacéutico más información.