

Combinación de Medicamentos para la Diabetes: Actoplus Met

Si tienes Diabetes Tipo 2 tal vez te receten una combinación de medicamentos para ayudarte a controlar la diabetes.

La pastilla combinada Actoplus Met ayuda a que las células de tu cuerpo se vuelvan más sensibles a la insulina con el tiempo y también ayudan a evitar que el hígado libere demasiada glucosa en el torrente sanguíneo.

Para entender cómo funcionan estas medicinas, veamos lo que sucede cuando comes. La mayoría de los alimentos se convierten en glucosa, una forma de azúcar. La glucosa entra en el torrente sanguíneo, provocando que se eleve el nivel de glucosa.

El páncreas libera insulina como reacción a esta elevación de glucosa. La insulina funciona como una llave que abre tus células y permite que entre la glucosa.

La glucosa se utiliza en ese momento como energía o se almacena para más tarde. Conforme la insulina extrae la glucosa de la circulación de la sangre y la introduce en las células, se reduce tu nivel de glucosa.

En muchas personas con Diabetes tipo 2, las células tienen dificultad para absorber la glucosa porque no pueden usar la insulina. Esto se conoce por resistencia a la insulina.

Al mismo tiempo, el hígado libera demasiada glucosa almacenada. Los dos causan que tu nivel de glucosa en sangre permanezca alto.

Actoplus Met ayuda a que tus células usen la insulina para abrirse y permitir que, entre la glucosa, y también evitan que tu hígado libere demasiada glucosa en el torrente sanguíneo.

Estas medicinas se toman generalmente una o dos veces al día.

Algunos efectos secundarios incluyen nivel bajo de glucosa en sangre o hipoglicemia, diarrea, náusea, dolor abdominal, inflamación de la parte inferior del cuerpo y dolores musculares.

Si tuvieras algún efecto secundario, avísale a tu equipo de cuidado de la diabetes. No debes dejar de tomar tu medicina para la diabetes a menos que te lo indiquen.

La salud de tu hígado y riñones debe ser evaluada antes de empezar a tomar estas medicinas, y como sea necesario a medida que continúes tomándolas.

Estos medicamentos pueden aumentar tu riesgo de una condición seria conocida por acidosis láctica. Tienes más probabilidad de desarrollar acidosis láctica si tienes ciertas condiciones de salud o si consumes grandes cantidades de alcohol.

Tal vez necesites dejar de tomar por un tiempo este medicamento antes de intervenciones médicas que utilicen líquidos de contraste.

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este vídeo como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.



Combinación de Medicamentos para la Diabetes: Actoplus Met

Aunque tal vez no hay una sencilla razón por la que tu nivel de glucosa en sangre esté elevado, 2 tratamientos para la diabetes combinados en una pastilla, puede beneficiar tu nivel de glucosa en sangre y el futuro de tu salud en general.

Este programa es únicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad, integridad o capacidad de este vídeo como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo médico si tiene problemas de salud.

healthclips[®]