

Tal vez tu doctor recete que te apliques una marca de insulina llamada Novolog para controlar tu diabetes.

Cuando tienes diabetes, tu cuerpo no produce suficiente insulina o no utiliza la insulina que el cuerpo produce, resultando en nivel alto de glucosa (o azúcar) en sangre.

Al inyectar Novolog ayudas a mantener tu nivel de glucosa en un nivel saludable.

Novolog es una Insulina de Acción Rápida, que significa que empieza a surtir efecto rápidamente- en 5 - 10 minutos. En 1 a 3 horas es cuando trabaja más, y dura un total de 3-5 horas.

Cuando apliques Novolog, un efecto secundario posible es hipoglucemia, o nivel bajo de azúcar en sangre. Aplica Novolog solo cuando estés listo para comer.

Debido a que Novolog empieza a bajar tu nivel de azúcar casi de inmediato, debes comer 5 a 10 minutos después de aplicarlo. De otra manera, podría bajar demasiado tu nivel de azúcar.

El nivel bajo de azúcar es un efecto secundario serio que puede provocar: dolor de cabeza, debilidad, sudor frío o sensación húmeda, temblores, hambre, latido rápido de corazón, irritabilidad, cambios de visión y mareo.

Si la ignoras, la Hipoglucemia puede empeorar y provocar que te desmayes.

Consulta con tu doctor sobre la mejor manera de tratar el nivel bajo de azúcar en sangre y siempre debes tener a la mano un carbohidrato de acción rápida, como tabletas o gel de glucosa, que encuentras en cualquier farmacia.

Otros efectos secundarios incluyen: enrojecimiento, inflamación o comezón en el sitio de la inyección, y una reacción alérgica como ronchas o dificultad para respirar.

¡Llama de inmediato al 911 si tienes una reacción alérgica!

Habla con tu doctor sobre una lista completa de efectos secundarios de Novolog.

Antes de aplicar Novolog, debes decirle a tu doctor si tienes antecedentes de problemas de riñones o de hígado. Tal vez tenga que ajustar tu dosis.

Tu doctor te dirá cuánto Novolog necesitas aplicar y la mejor manera de aplicarlo.

Ya sea que uses una jeringa, una pluma inyectora, Novolog se debe aplicar en el tejido graso, bajo la piel.

# Novolog

Las áreas recomendadas para la inyección son: el abdomen o vientre, la parte trasera de los brazos, la parte superior o lados del muslo, y los glúteos o trasero.

Debes tratar de darle rotación donde te aplicas la medicina, utilizando un patrón regular, como un reloj. Esto ayuda a mantener sanos la piel y los tejidos.

Almacena cualquier Novolog no abierto en el refrigerador. Una vez abierto, el Novolog se puede almacenar a temperatura ambiente y se tiene que usar antes de 28 días o desechar, aunque haya sobrado Novolog.

No utilices Novolog después de la fecha de vencimiento que tiene el frasco o la pluma.

Nunca guardes insulina en lugares muy calientes o fríos.

Y nunca uses Novolog que tenga color amarillo. Novolog debe ser claro y sin color.

Si tienes alguna duda sobre Novolog, pídele a tu doctor o farmacéutico más información.