

Lovenox

Si tienes o corres riesgo de tener una trombosis de vena profunda o TVP, quizá te receten Lovenox. Tal vez te sea conocido su nombre genérico, Enoxaparin.

Con la TVP, se pueden formar coágulos en las venas profundas de tu cuerpo; normalmente en las piernas, y puede causar serios problemas de salud.

A veces un coágulo se puede despegar y moverse por los vasos sanguíneos. Esto se conoce por 'émbolo', y el coágulo en movimiento puede llegar al corazón o los pulmones y provocar complicaciones graves como un ataque cardíaco, dificultad para respirar -inclusive la muerte.

Lovenox es una medicina inyectable que se utiliza para deshacer estos coágulos y mantener la sangre menos espesa.

Es un medicamento poderoso. Algunas personas no deben tomarla. No tomes Lovenox si eres alérgico a: Cualquiera de sus ingredientes, O a otro anticoagulante como la Heparina.

Antes de tomar Lovenox comparte con tu médico tu historial de salud. No apliques Lovenox si tienes sangrado activo o no controlado, o si tienes niveles bajos de plaquetas en la sangre.

Antes tomar Lovenox, avísale a tu médico si estás embarazada, planeas estarlo o estás amamantando.

Tal vez haya otro medicamento que te pueda recetar.

Algunas medicinas que no necesitan receta médica pueden aumentar tu riesgo de sangrado. Cuando te apliques Lovenox, evita: La aspirina, Ibuprofeno como Advil o Motrin, y Naproxeno como Aleve.

Consulta a tu profesional médico sobre tus opciones de medicamentos.

Te harán pruebas de sangre regularmente si te aplicas Lovenox, para ver si está funcionado bien. No faltes a ninguna cita con tu médico.

El efecto secundario más común de Lovenox, es sangrado o moretones. Ten cuidado y evita cortadas o lastimarte.

Otros efectos secundarios comunes incluyen: anemia, dolor de cabeza, mareo, y falta de respiración.

Si tuvieras cualquiera de estos efectos secundarios, llama a tu médico y pregúntale cómo debes manejarlos.

Si tuvieras una reacción alérgica, tos con sangre, tienes sangre en la orina o las heces, un sangrado que no se detenga; o te desmayaras; llama al 911 para obtener ayuda de emergencia.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Lovenox

Esta no es una lista completa de los efectos secundarios. Asegúrate de repasar todos los efectos secundarios posibles con tu profesional médico.

Lovenox se debe aplicar en el abdomen o área del vientre, a 2 pulgadas de distancia del ombligo.

Debes alternar los lados del vientre con cada inyección. Esto ayuda a mantener la piel y los tejidos del área sanos.

Tal vez indiquen aplicarte Lovenox cada 12 horas o quizá solo una vez al día.

Si omites una dosis, debes aplicarla lo antes posible.

Si es casi hora de tu próxima dosis, omite la dosis que te faltó, y vuelve a tu horario normal de medicamentos.

Almacena Lovenox a temperatura ambiente, en un lugar que no sea demasiado caliente o frío, y en un lugar seco y sin luz directa.

Debes mantenerla fuera de la vista y del alcance de los niños.

Debes consultar a tu profesional médico o farmacéutico sobre la manera adecuada de desechar cualquier medicina que no uses.

Lovenox puede reducir tu riesgo de coágulos de sangre peligrosos. Pero es un medicamento poderoso que se debe tomar únicamente de la manera indicada.

Si tuvieras preguntas sobre Lovenox, pídele más información a tu profesional médico o farmacéutico.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.

