

Paso a Paso: Colocación de Sonda NG para un Bebé

Colocación de Sonda NG a un Bebé.

Junta tus materiales.

Lávate las manos con agua y jabón mínimo 20 segundos.

Recuesta a tu bebé boca arriba, sujeta la punta que tiene hoyo de la sonda NG en la punta de la nariz de tu hijo.

Que llegue el tubo hacia el lóbulo de la oreja y después hasta la mitad del abdomen, sujetándolo en cada parte.

Pon cinta adhesiva y marca alrededor del tubo donde se encuentra a la mitad de su abdomen.

Coloca un protector de piel en la mejilla de tu bebé.

Pon lubricante a base de agua en la punta del tubo que tiene el hoyo, introduce el tubo por la nariz de tu hijo.

Introduce el tubo hasta que la marca con cinta haya tocado la punta de su nariz.

Asegura el tubo en la mejilla de tu hijo encima del protector de la piel.

Tal vez te pidan que cheques el pH para verificar la colocación de la sonda NG.

Para checar el pH conecta la jeringa al otro extremo del tubo, girándola para conectarla bien.

Si la sonda NG tiene una abrazadera, quítala del tubo.

Jala ligeramente el émbolo hasta que haya un poco de líquido en la jeringa.

Vuelve a colocar la abrazadera.

Desconecta el tubo de la punta de la jeringa.

Aplica el líquido de la jeringa en una tira reactiva de PH.

Debe coincidir el color de la tira con el nivel que corresponde de PH en la tabla.

La sonda está en el lugar correcto si el PH es cinco o menos.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.

