

Uso de Jabón Líquido de Gluconato de Clorhexidina (CHG) Antes de la Cirugía

Uso de Jabón Líquido de Gluconato de Clorhexidina (CHG) Antes de la Cirugía.

Siempre debes seguir las instrucciones específicas del producto y de tu médico al usar el jabón líquido CHG.

Primero, báñate con jabón normal y agua. Enjuágate bien. Cierra el agua.

Vierte el jabón CHG en un paño limpio y húmedo.

Con cuidado lava tu cuerpo del cuello hacia abajo. No uses el jabón CHG en la cara.

Sigue las instrucciones de tu equipo médico para el uso de CHG en las áreas genital y rectal.

Para mejores resultados, no enjuagues el jabón de la piel durante 2 minutos. Enjabonar todo el cuerpo antes de enjuagar, generalmente toma unos 2 minutos.

No rasures ninguna parte de tu cuerpo debajo del cuello.

Enjuaga totalmente el jabón CHG.

Permite que seque tu piel al aire. No uses una toalla para secarte. Quizá sientas que tu piel está pegajosa por unos minutos hasta que seque.

Una vez seca tu piel, puedes vestirte. No uses maquillaje, cremas, talco o desodorante en la piel.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.

