

Endoscopía Digestiva Superior

Una endoscopia digestiva superior es una prueba que le permite al doctor visualizar el interior de su esófago, estómago, y la parte inicial del intestino delgado. Antes del procedimiento tal vez no podrá comer ni beber por un determinado tiempo.

Le darán medicamento para prevenir el dolor y ayudar a que se relaje. No sentirá ni recordará el procedimiento. El doctor colocará un tubo delgado y flexible, llamado endoscopio en la boca y lo moverá suavemente por la garganta hasta el estómago. Podrá respirar normalmente.

El doctor puede revisar qué es lo que le provoca dolor de estómago o dificultad para tragar, o identificar señales de problemas como reflujo de ácido en el esófago o sangrado en el estómago. El doctor también puede usar el endoscopio para tomar una muestra de tejido y analizarlo – biopsia; extirpar crecimientos o detener sangrado.

El procedimiento normalmente toma de 15 a 30 minutos. A menos que necesite estar en el hospital, tal vez podrá irse a casa después de que se acabe el efecto del medicamento, normalmente entre 1 y 2 horas. Necesitará que alguien lo lleve a casa.

Su equipo médico le informará cuando puede volver a manejar. Después del procedimiento, tal vez se sienta somnoliento al inicio, y quizás tenga molestia de garganta uno o dos días.

Pero debería poder regresar a sus actividades normales al día siguiente.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.

