

Colocación de un Stent en la Arteria Carótida: Regreso a Casa

Te sentirás adolorido después de la colocación de un stent en la arteria carótida.

Es posible que también tengas un moretón y un pequeño chichón donde colocaron el catéter.

Esto es normal y va a desaparecer. Es importante tener cuidado con tu actividad por unos días para que sane el área donde colocaron el catéter.

Puedes hacer cosas sencillas en casa, como tareas ligeras o cocinar. Pero no levantes nada pesado y no hagas ejercicio intenso.

Si lo permite tu doctor, puedes caminar tranquilamente. Te puedes bañar de 24 a 48 horas después de la intervención.

No remojes el área ni tome baños de tina por 1 semana, o hasta que tu doctor lo indique. Puede parecer mucho que recordar, pero no te preocupes.

Antes de irte a casa, el personal médico te explicará tu plan de cuidado.

El plan incluirá información sobre citas de seguimiento, cuidado de especialistas, y cualquier análisis que puedas necesitar, y a quién llamar si tuvieras un problema.

Este es un buen momento para hacer preguntas. Quizá cambien también tus medicamentos, debes asegurarte de que entiendes cuáles y cómo tomarlos.

Tu plan también incluye un estilo de vida saludable, como alimentación sana, ser activo y no fumar. Esto te dará la posibilidad de tener una vida más larga y saludable.

También te darán instrucciones sobre cómo cuidar el área donde colocaron el catéter.

Esta atento si notas un bulto que aumenta de tamaño en el área. Y si tienes sangrado en la zona.

Pero llama a tu doctor si notas que el vendaje se satura con sangre color rojo vivo.

También debes llamar al doctor si tienes síntomas de infección, como aumento de dolor, inflamación, calor o enrojecimiento; supuración en el área.

Y llama si tienes dolor de pierna, brazo, o mano, se ve azulado, se siente frío, adormecido o tiene hormigueo.

Busca ayuda de emergencia si tienes señales de un ataque cerebral.

Estos incluyen dolor de cabeza repentino y severo, como nunca lo hayas tenido; adormecimiento, hormigueo o debilidad repentinos; pérdida de movimiento en la cara, brazo o piernas.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Colocación de un Stent en la Arteria Carótida: Regreso a Casa

Si te sientes algo nervioso ahora, es normal.

Te conoces mejor que nadie, así que llama a tu doctor si tienes alguna pregunta.

La recuperación y sanar toman tiempo.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.

