

Implante Coclear: Regreso a Casa

Mientras sanas, estará adolorida e inflamada el área detrás de tu oído después del implante coclear.

Tal vez sientas dolor y tengas dolor de cabeza unos cuantos días. Quizá también escuches un sonido como un pop o clic en el oído.

O tal vez te sientas mareado. Quizá las cosas tengan un sabor diferente.

O que tengas dolor de garganta. Estos síntomas desaparecerán con el tiempo.

Después de unas 3 a 6 semanas del implante coclear, y que haya sanado la herida, el audiólogo lo prenderá.

El doctor te pedirá que trabajes con un terapeuta del habla y un audiólogo para aprender cómo aprovechar el máximo de tu dispositivo.

La mayoría logran regresar al trabajo y su rutina normal 1 o 2 semanas después de la cirugía. Una vez en casa, asegúrate de seguir todas las instrucciones de dieta y actividad, y toma los medicamentos de la manera indicada.

Y debes seguir las instrucciones sobre el cuidado de la herida. Observa si notas síntomas de problemas.

Llama a tu doctor si tiene problemas como dolor nuevo o que empeora, o si se abre la incisión. Llama si tienes señales de infección, incluyendo enrojecimiento, pus o inflamación cerca de la herida.

Y llama si tienes señales de una infección del oído, como escurrimiento del canal auditivo. Busca ayuda de inmediato si te desmayas o te falta la respiración.

Otra cosa a la que tienes que estar atento después de un implante coclear: meningitis. Llama a tu doctor o busca ayuda de inmediato si tienes señales de meningitis.

Esto incluye una fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez de cuello, sentirte enfermo del estómago o vómito, tienes dificultad para ver luces brillantes, y tienes somnolencia o confusión.

Te conoces mejor que nadie, así que llama a tu doctor si tienes alguna pregunta.

Cuidándote después de una cirugía, ayuda a evitar problemas y sanar más rápido.