

# Cuidado de la Intravenosa de su Hijo

Una intravenosa, o I.V. permite que se administren líquidos o medicina directamente en la vena, para que lleguen de inmediato al torrente sanguíneo de su hijo y al resto de su cuerpo.

Casi siempre, la I.V. se coloca en la parte trasera de la mano, el antebrazo o la parte interior del codo.

El área donde le colocaron la I.V. en la mano o brazo puede estar un poco adolorida o con moretones después de que se la retiren.

Es buena idea cuidar de esta área cuando su hijo vaya a casa.  
[sonidos de juegos de video] Observe el área por unos días.

Esté atento a cualquier problema como moretones o inflamación.

Si nota inflamación o moretones, coloque hielo o un empaque frío en el área de 10 a 20 minutos cada vez.

Recuerde de colocar una tela delgada entre la bolsa de hielo y la piel de su hijo.

Su hijo debe poder hacer sus actividades normales, a menos que indique lo contrario su doctor.

Asegúrese de que su hijo tenga cuidado con esa parte del brazo por uno o dos días.

Su hijo se puede bañar como lo hace normalmente.

Llame a su doctor o busque ayuda médica, si su hijo tiene señales de infección, como aumento de dolor, inflamación, calor o enrojecimiento; líneas rojas que salen de la herida, pus o sangre que drena del área; o tiene fiebre.

Y recuerde llamar a su doctor si nota moretones nuevos o un bulto grande en el área.