

Aprenda sobre la laringoscopia de su hijo

Una laringoscopia es una prueba que le permite a su médico observar el interior de la garganta de su hijo, la laringe y las cuerdas vocales.

Antes de la prueba, asegúrese de seguir las instrucciones del médico para preparar a su hijo, incluyendo cuándo debe dejar de comer y beber.

El médico puede adormecer la nariz y la garganta a su hijo para ayudar a que sienta menos molestia.

Una laringoscopia flexible utiliza un endoscopio que pasa por la nariz y baja suavemente por la garganta de su hijo.

Dependiendo del problema, el médico podría pedirle a su hijo que haga algunos sonidos agudos como "i-i-i" o graves como "a-a-a".

Esto ayuda al médico a ver las cuerdas vocales de su hijo mientras se mueven.

La prueba suele durar 5 o 10 minutos.

Puede quedarse con su hijo durante la prueba.

Hay otro tipo de laringoscopia que usa un endoscopio rígido que se introduce en la boca para mostrar la parte posterior de la garganta.

Normalmente se hace con una cirugía.

El médico la usa para extraer un objeto que está atorado en la garganta o para obtener una muestra de tejido.

Antes de este procedimiento, su hijo recibirá un medicamento para que no sienta nada.

Después de una laringoscopia, su hijo probablemente podrá irse a casa de inmediato.

Pero si se le hizo una laringoscopia rígida y una cirugía a su hijo, el médico le dirá cuándo puede volver a casa.

Cuando esté de vuelta en casa, anime a su hijo a descansar lo suficiente.

Es posible que su hijo tenga adolorida la nariz o la garganta.

Puede darle líquidos, como agua, jugo de manzana y paletas de hielo de sabores.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.



Aprenda sobre la laringoscopia de su hijo

Evite las bebidas calientes, refrescos y los jugos cítricos como el jugo de naranja.

Cuando su hijo esté listo para comer, comience con alimentos fáciles de tragar, como fideos blandos, pudín, frutas enlatadas o cocidas, huevos revueltos y puré de papas.

Una laringoscopia podría causar temor, especialmente en los niños.

Pero el doctor y equipo médico estarán allí todo el tiempo para asegurarse de que su hijo esté bien.

Este programa es solo para fines informativos. El editor se deslinda de cualquier garantía, con respecto a la exactitud, integridad o idoneidad de este video para la toma de decisiones médicas. Para todo asunto relacionado con la salud, por favor consulte a su profesional médico.

