





Mira el video

Cáncer cervical



Descripción general

El cáncer cervical se produce aquí, en el cuello del útero. Esta es la parte más baja de la matriz (o útero) de una mujer. Si este cáncer se descubre en forma temprana, se le puede curar. Si no se le trata, puede extenderse a otras partes de su cuerpo.

Causas

Este tipo de cáncer suele estar relacionado con el virus de papiloma humano. Lo llamamos VPH. El VPH se contagia por vía sexual. Muchos hombres y mujeres son portadores de este virus. Este puede cambiar algunas células en su cuello uterino. Las células pueden crecer fuera de control. Eso es cáncer. No todas las mujeres con VPH desarrollarán cáncer cervical, pero algunas sí.

Factores de riesgo

Usted está en mayor riesgo de tener cáncer cervical, si mantiene relaciones sexuales con muchas personas. Es mayor si comienza a tener relaciones sexuales a temprana edad. Su riesgo es más alto si tiene un sistema inmunológico débil y si padece ciertas enfermedades de transmisión sexual. Está en un riesgo mayor, si alguien de su familia ha tenido VPH. Es también mayor si fuma.

Síntomas

Es posible que este tipo de cáncer no produzca síntomas al principio. Pero a medida que crece, puede ser que sangre y que presente un flujo vaginal diferente de sus períodos normales. Es posible que le duela la pelvis. Y que las relaciones sexuales le resulten dolorosas.

Tratamiento

El tratamiento depende de cuánto haya crecido el cáncer. Algunas veces se pueden extirpar o destruir solo las células cancerosas. Si eso no es posible, puede ser que necesite cirugía para extirpar todo o parte de su cuello uterino, el útero u otros tejidos.

Pruebas de detección

Detectar el cáncer temprano es importante. Una simple prueba de Papanicolaou (también llamada citología vaginal o frotis de Pap) puede encontrar signos de cáncer antes de que éste comience. Por eso, hágase exámenes médicos en forma regular. Y hable con su médico acerca de las pruebas para detectar cáncer cervical.