




Mira el video

Displasia cervical



Descripción general

Este es un cambio en las células de su cuello uterino. Esa es la parte inferior de su útero. Si usted tiene displasia cervical, las células del cuello uterino comienzan a mostrar señales que no son normales. No son células cancerosas, pero pueden volverse cancerosas con el tiempo.

Causas y factores de riesgo

La displasia cervical es generalmente causada por un virus común conocido como "virus del papiloma humano". Lo llamamos "VPH". Este se contagia a través del contacto sexual. No todas las formas de este virus conducen a la displasia cervical, pero algunas sí lo hacen. Otros factores aumentan su riesgo de displasia cervical. Entre ellos se encuentran la actividad sexual a temprana edad, tener múltiples parejas sexuales y tener un bebé antes de los 16 años. Su riesgo es también mayor si su sistema inmunológico está debilitado o si es fumador.

Síntomas

La displasia por lo general no produce síntomas. Es importante que le hagan exámenes pélvicos en forma regular, de modo que su médico pueda observar si hay cambios en dichas células.

Tratamiento

El tratamiento depende de sus necesidades. Si la displasia es leve, esta puede desaparecer por sí sola sin necesidad de tratamiento. Pero si empeora, usted necesitará tratamiento para eliminar las células anormales. Y, le puede ser de beneficio recibir la vacuna del VPH, incluso si usted ya tiene el virus. Su proveedor de salud puede crear un plan de cuidados que sea adecuado para usted.