




Polipectomía de colon



Descripción general

Este procedimiento extirpa crecimientos anormales, llamados "pólipos", de la pared interna de su intestino grueso. Este procedimiento dura por lo general de 30 minutos a una hora.

Preparación

En preparación, se le administra un medicamento para relajarlo y minimizar las molestias. Se le acuesta de lado. El médico inserta un colonoscopio en su recto. Este es un instrumento con una pequeña cámara conectada a un tubo blando y flexible. Este es guiado lentamente en su colon. Es posible que se bombee aire a través del colonoscopio para inflar su colon.

Extirpación

Se examina cuidadosamente el revestimiento de su colon. Sus pólipos pueden eliminarse por medio de un lazo. Este se coloca en su colon a través de un canal de trabajo del colonoscopio. Los pólipos pueden extirparse también con un dispositivo láser. Este tejido luego podrá examinarse en busca de señales de células cancerosas. La mayoría de los pólipos son benignos, pero con el tiempo algunos pueden desarrollar cáncer.

Fin del procedimiento y cuidados postoperatorios

Cuando el procedimiento se ha completado, se le observa durante un período breve mientras pasa el efecto del medicamento. Es normal que tenga calambres, hinchazón o gases. La mayoría de las personas se recuperan y regresan a una dieta normal al día siguiente.