



Mira el video

Síndrome del diente fisurado (SDF)



Descripción general

Una fisura muy pequeña en su pieza dental puede ser dolorosa. Puede producirse por encima o por debajo de la línea de las encías. La grieta puede ser tan pequeña, que usted no puede notarla. En ocasiones, su dentista tiene dificultad para verla, incluso con radiografías. Esto puede ser frustrante. A este problema lo denominamos "síndrome del diente fisurado".

Causas

Las grietas pueden formarse en los dientes por diversas razones. Es posible que, en forma inconsciente, rechine sus dientes mientras duerme. Es posible que sus dientes no estén correctamente alineados y que eso ejerza demasiada presión sobre un solo diente. Un empaste grande o una endodoncia pueden debilitar la estructura de un diente.

Síntomas

El síndrome del diente fisurado, por lo general, afecta a uno de sus molares. Los molares son las piezas dentales posteriores, que se utilizan para triturar. Si usted tiene este síndrome, su pieza dental afectada no duele todo el tiempo, pero ciertas cosas pueden desencadenar el dolor. Puede doler al masticar los alimentos. Puede doler cuando come o bebe algo demasiado caliente o demasiado frío. Puede ser difícil para usted saber cuál es la pieza dental que duele.

Tratamiento

El tratamiento depende del tamaño y la ubicación de la grieta y de la salud de su pieza dental. Su dentista creará un plan de cuidados que sea adecuado para usted.