




Mira el video

## Alveolitis seca



### Descripción general

Este es un problema que puede ocurrir después de que se extrae una pieza dental de forma permanente. Cuando le extraen un diente, lo habitual es que se forme un coágulo de sangre en el alvéolo (o hueco) vacío. Este coágulo protege al hueso y a los nervios subyacentes. Pero si no se forma el coágulo, o si se forma pero luego se disuelve o se desprende, los nervios quedan expuestos. Esto es una "alveolitis seca". Puede ser muy dolorosa.

### Causas

No siempre sabemos qué causa la alveolitis seca. Beber bebidas calientes o comer alimentos sólidos puede hacer que se desprenda el coágulo. También puede suceder al sorber con una pajita. El coágulo se puede desprender si usted se mantiene muy activo mientras está sanando. El uso del tabaco puede incrementar su riesgo de sufrir de alveolitis seca. También pueden hacerlo las píldoras anticonceptivas.

### Síntomas

Entre los síntomas se encuentra el dolor severo que puede irradiarse hacia su oído, ojo, cabeza y cuello. Es posible que el alvéolo se vea vacío y que se pueda ver el hueso en el fondo. Es posible que tenga mal sabor de boca y mal aliento.

### Tratamiento

La alveolitis seca se trata con una compresa medicada y con medicamentos para calmar su dolor. Si usted tiene alveolitis seca, comuníquese con su dentista o cirujano oral, en forma inmediata.