

Enfermedad de Dupuytren

PALMA DE LA MANO



Descripción general

Esta condición es un engrosamiento de la fascia en la palma de la mano. La fascia es un tejido conectivo localizado justo por debajo de la piel de la palma y los dedos de la mano. Esta fascia engrosada puede formar abultamientos o nódulos debajo de la piel, o cordones largos y gruesos de tejido que se extienden desde la palma de la mano hasta los dedos. A menudo, este tejido engrosado se contrae, causando que uno o más dedos se encorven quedando flexionados hacia la palma de la mano. Esto es llamado contractura de flexión.

Diátesis de Dupuytren


La diátesis de Dupuytren es una forma más agresiva de la enfermedad de Dupuytren que ocurre antes de los 40 años de edad. La misma está asociada con factores familiares hereditarios y afecta ambas manos. Una persona que padece de diátesis de Dupuytren comúnmente padece otras enfermedades de la fascia, tales como nódulos y contracturas en la planta de los pies (llamada enfermedad de Ledderhose) y la curvatura del pene (llamada enfermedad de Peronye).

Causas

Se desconoce la causa exacta de la enfermedad de Dupuytren. La misma afecta con mayor frecuencia a hombres caucásicos de ascendencia del norte de Europa y Escandinavia mayores de 60 años. Es más predominante en pacientes con diabetes. El tabaquismo, las enfermedades pulmonares, el alcoholismo y los medicamentos anti-convulsivos son factores asociados con la enfermedad de Dupuytren, aunque no está aún clara la exacta relación de estos factores con la enfermedad. El traumatismo de la mano también puede jugar un papel en su desarrollo.

Síntomas

El primer síntoma es un nódulo firme e indoloro debajo de la piel de la palma de la mano, más comúnmente alineado con el dedo anular o el dedo meñique. A medida que la enfermedad progresa, las bandas normales de la fascia pueden engrosarse y convertirse en cordones que se extienden a uno o más dedos. A medida que el cordón se contrae, los dedos afectados comienzan a encorvarse y puede ser imposible extenderlos completamente.



Enfermedad de Dupuytren



Tratamiento

No hay tratamiento para curar o prevenir la enfermedad de Dupuytren o su progresión, pero se puede aplicar tratamiento para aliviar la severa contractura de los dedos. Las opciones de tratamiento incluyen la extirpación quirúrgica del tejido fascial engrosado o un procedimiento ambulatorio para la liberación de la contractura mediante una aguja. También puede ser tratado con la inyección de una enzima llamada colagenasa. Esta enzima debilita el cordón contraído y permite que éste se pueda tirar y romper.