



## Panadizo del pulpejo



### Descripción general

Esto es una infección en la yema del dedo o del pulgar. Ese es el tejido carnoso que se encuentra debajo de su huella dactilar. Un panadizo es un problema grave y doloroso. Sin tratamiento, puede conducir a graves complicaciones.

### Causas

¿Cuál es la causa del panadizo? Ocurre cuando las bacterias se introducen a través de una herida en la piel. Cualquier cosa que perfora la yema del dedo puede permitir la entrada de bacterias. Puede ocurrir si se corta o se clava una astilla. Se puede producir si es diabético y se extrae sangre del dedo de forma habitual.

### Síntomas

¿Cuáles son los síntomas? Un panadizo hace que se acumule pus en la yema del dedo. La yema del dedo se hincha. Esto presiona los nervios y otros tejidos. Puede provocar un dolor intenso y pulsátil. La yema del dedo puede estar enrojecida y sentirse caliente al tacto. Una infección grave se puede extender hasta el hueso, la articulación o los tendones cercanos.

### Tratamiento

¿Cómo tratamos un panadizo? Hacemos una incisión para drenar el pus. Le daremos antibióticos para combatir la infección y es posible que tenga que poner el dedo en remojo con regularidad mientras se cura. Si la infección es grave, probablemente haya que operar. Su médico creará un plan de cuidados que sea adecuado para usted.