




Mira el video

## Fusión de la articulación del dedo (de la articulación interfalángica distal)




### Descripción general

Esta intervención bloquea de forma permanente una articulación dañada del dedo para tratar el dolor intenso de la artritis. Después de la operación, la articulación no se podrá flexionar. Se puede fusionar cualquier articulación del dedo, pero la mayoría de las veces fusionamos la articulación más cercana a la punta del dedo.



### Preparación

Para comenzar, le damos un medicamento para que se sienta relajado y adormecido. Es posible que se le administre anestesia general. Luego hacemos una incisión para llegar a la articulación dañada. Retiramos el cartílago de los extremos de los huesos que concurren en la articulación. Damos forma a los extremos de estos huesos para que encajen perfectamente.



### Fusión

Ahora es el momento de la fusión. Existen varios métodos para fijar estos huesos. Podemos utilizar una varilla, uno o varios clavos, una placa y tornillos o cualquier otro dispositivo para unir los huesos. Con el tiempo, crecerá un nuevo tejido óseo entre ellos. Esto crea una fusión sólida.

### Fin del procedimiento

Al terminar la cirugía, cerramos la incisión, vendamos el dedo y lo colocamos en una férula. Es posible que tenga que usar un yeso mientras se recupera. Siga sus instrucciones de cuidados para lograr una recuperación segura.