




Mira el video

Artrodesis Lapidus (con fijación de placa medial)



Descripción general

Este procedimiento fusiona dos huesos del pie. Estos son el primer metatarsiano y el cuneiforme medial. Se puede utilizar este procedimiento para tratar la artritis. Puede utilizarse como parte de una bunionectomy (corrección de juanete). También se puede utilizar como parte de un procedimiento para corregir el pie plano.

Preparación

En preparación para el procedimiento, se le administrará anestesia. Se le realiza una incisión en la piel para exponer la articulación tarsometatarsiana. Este es el lugar donde el primer metatarsiano se encuentra con el cuneiforme medial.

Preparación de los huesos

El cirujano separa cuidadosamente estos huesos. Se elimina el cartílago de los extremos de los huesos.

Asegurando los huesos

El cirujano estabiliza los huesos con una placa de metal y tornillos. Esto los mantiene en una posición corregida. El cirujano puede añadir un injerto óseo o células madre en el lugar. Con el tiempo estos huesos sanarán, creando una fusión.

Fin del procedimiento y cuidados postoperatorios

Una vez completado el procedimiento, se cierra la incisión. Se le vendará el pie y se le colocará en un yeso o férula. Se le controlará durante un tiempo breve antes de ser dado de alta. Se le puede pedir abstenerse temporalmente de aplicar peso sobre el pie luego de la cirugía. Su médico le dará instrucciones específicas para ayudar a su recuperación.