




Mira el video

## Punción lumbar diagnóstica (Punción raquídea)



### Descripción general

Esta es una forma de obtener una muestra de su líquido cefalorraquídeo (al que llamamos "LCR"). Este es el líquido que fluye alrededor de su cerebro, su médula espinal y los nervios espinales. El análisis de este líquido mostrará signos de sangrado, infección u otros problemas.

### Preparación

Para comenzar, usted se sienta o se acuesta de lado y se dobla hacia adelante para dejar expuesta la parte baja de su espalda. El médico le aplica una inyección para adormecer su piel.

### Toma de la muestra

Luego, el médico inserta una aguja en su espalda. La empuja cuidadosamente entre dos vértebras y la introduce en el saco dural (esa es la vaina que protege sus raíces nerviosas). La aguja no se acercará a su médula espinal, porque su médula espinal termina un nivel más arriba de donde se coloca la aguja. El líquido cefalorraquídeo irá goteando lentamente a través de la aguja. El médico lo recoge en viales para estudiarlo.

### Fin del procedimiento

Cuando el procedimiento concluye, se le retira la aguja y se le vende la espalda. A algunas personas les duele la cabeza después del procedimiento. Es posible que le pidan que se acueste durante un corto tiempo para reducir las probabilidades de que esto suceda.

