





Mira el video

Miomectomía (morcelador histeroscópico)



Descripción general

Este procedimiento ambulatorio se usa para remover uno o varios fibromas - crecimientos que comúnmente se desarrollan sobre en las paredes del útero. El procedimiento se realiza con la ayuda de un dispositivo especializado llamado histeroscopio, que es introduce en el útero a través del cuello uterino. El histeroscopio posee una luz, una cámara y un instrumento cortante llamado morcelador.

Preparación

Como preparación para el procedimiento, la paciente se coloca en posición y se le administra anestesia local. El médico introduce un espéculo en la vagina para permitir acceso al cuello del útero.

Acceso al útero

El médico introduce cuidadosamente el histeroscopio en el útero a través del cuello uterino. Se llena el útero con un líquido que pasa a través de un canal en el histeroscopio, dilatándolo, para permitir al médico examinar las paredes uterinas y localizar el fibroma.

Removiendo el fibroma

Cuando el histeroscopio está en la posición apropiada, el morcelador (o troceador) se extiende hasta llegar al fibroma. El médico activa el dispositivo para cortar y remover partes del fibroma por medio de una cuchilla morceladora. Durante el proceso de corte se succionan las partes cortadas hacia el exterior del útero.

Fin del procedimiento y cuidados postoperatorios

Una vez concluido el procedimiento, el médico retira el líquido y los instrumentos. Luego de una permanencia breve en el cuarto de recuperación, se le permite a la paciente regresar a casa. El médico proporcionará instrucciones específicas para los cuidados postoperatorios. La recuperación total ocurre generalmente dentro de la primera semana después del procedimiento.