




Cistectomía ovárica (Laparoscópica)



Descripción general

Este procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo se realiza para extirpar un quiste que se ha desarrollado en un ovario. Se realiza con la ayuda de un telescopio de inspección provisto de luz, llamado laparoscopia y es un procedimiento ambulatorio.

Acceso a los ovarios

Como preparación para el procedimiento, la paciente es colocada en posición y se le administra anestesia general. El cirujano hace de una a tres incisiones diminutas en el abdomen para alcanzar el ovario. Cuidadosamente el cirujano infla el abdomen con dióxido de carbono. Esto levanta la pared abdominal y separa los órganos, creando un espacio para que el cirujano pueda insertar el laparoscopia y con seguridad acceder y visualizar los órganos pélvicos.

Extracción del quiste

El cirujano usa instrumentos delgados para separar cuidadosamente el quiste del ovario. Luego extrae el quiste del abdomen con fórceps o succión. Se enviará este tejido al laboratorio de patología para un examen más minucioso.

Fin de procedimiento

Cuando termina el procedimiento, se cierran y se vendan las incisiones. La paciente podrá regresar a su casa el mismo día de la cirugía. El ejercicio vigoroso y la actividad sexual deberían ser limitados durante unos días. La recuperación por lo general toma aproximadamente dos semanas.