



Mira el video

Reemplazo parcial de la primera articulación MTF (base de la falange proximal)



Descripción general

Este procedimiento trata la artritis severa de la articulación en la base del dedo gordo del pie. Esta es la primera articulación metatarsofalángica, comúnmente llamada primera articulación "MTF". La artritis en esta articulación puede producir dolor e hinchazón. Puede limitar su capacidad para caminar y puede limitar los tipos de zapatos que usted puede usar con comodidad. Durante este procedimiento, se inserta un implante para mejorar la función de esta articulación.

Preparación

En preparación para el procedimiento, se le aplicará anestesia general. El cirujano hace una incisión en su piel para dejar expuesta la articulación MTF.

Extracción de los crecimientos óseos

El cirujano extirpa con cuidado los crecimientos óseos de los extremos de los dos huesos que se unen en esta articulación. Estos son la falange proximal y el primer metatarsiano. Es posible que el cirujano recorte también la falange proximal para crear un espacio para el implante.

Inserción del implante

El cirujano hace un pequeño canal en el extremo de la falange proximal. Se presiona el implante para asegurarlo en su lugar. El implante cubre y proporciona una nueva superficie para el extremo de este hueso. Así mismo, le permite a la articulación deslizarse con suavidad, mejorando la función.

Fin del procedimiento y cuidados postoperatorios

Una vez completado el procedimiento, se cierra la incisión. Se le vende el pie, y usted podrá usar una pantufla o un zapato posoperatorio. Se le controlará durante un tiempo breve antes de ser dado de alta. Es posible que se le pida que por un tiempo se abstenga de aplicar peso sobre el pie, después de la cirugía. Su médico le dará instrucciones específicas para ayudar a su recuperación.

