





Mira el video

Gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) - Colocación de la sonda



Descripción general

Durante este procedimiento, se coloca una sonda de alimentación en su estómago. Esta sonda o tubo, se utilizará para suministrarle alimentos, fluidos y medicamentos (si fuesen necesarios). La sonda PEG resulta muy útil para pacientes que presentan problemas para tragar.

Inserción del endoscopio

Primero, se le administran medicamentos que le relajarán y aliviarán el dolor. Un anestésico local le adormece el abdomen. Luego, el médico utiliza una cámara llamada endoscopio. Con cuidado se guía este tubo blando y flexible por su garganta y se lo dirige hacia su estómago.

Creación de la incisión

Un médico inspecciona la mucosa estomacal con el endoscopio. Despues de ubicar el mejor lugar para que la sonda entre en su estómago, el médico lo alumbría con la luz brillante del endoscopio. La luz se puede ver a través de la piel de su abdomen. Se realiza una pequeña incisión en su piel.

Colocación de la sonda

Se pasa un tubo llamado catéter a través de esta incisión y se lo inserta dentro del estómago. Se pasa un alambre guía a través del catéter y se lo hace ascender a través de un canal en el endoscopio. Se retira el catéter. Su médico une la sonda PEG al alambre guía y tira de éste a través del endoscopio y hacia el interior de su estómago. Se tira del extremo de la sonda PEG y se la extrae cuidadosamente a través de la abertura.

Fin del procedimiento

Se recorta el extremo de la sonda, dejando que sobresalgan unas seis u ocho pulgadas de la misma. Se le coloca un tope a la sonda, la cual se adhiere a su piel con una cinta, para su seguridad y comodidad. Es posible que su abdomen presente dolor durante unos pocos días después del procedimiento. Su equipo de atención médica le mostrará cómo utilizar su sonda PEG y cómo mantenerla limpia.