





Mira el video

## Úlcera péptica



### Descripción general

Esta es una llaga que se forma en el revestimiento de su tracto digestivo. Se desarrolla cuando los ácidos del estómago dañan la capa de mucosa que protege las paredes de su tracto digestivo. Una úlcera péptica se puede formar en su estómago. También puede formarse en su esófago o en la parte superior de su intestino delgado.

### Causas y factores de riesgo

La mayoría de las úlceras pépticas son producidas por una bacteria común llamada *H. pylori*. Esta bacteria puede infectarlo y vivir en su tracto digestivo. En la mayoría de las personas, una infección de *H. pylori* no produce problemas. Pero en algunos, la bacteria ataca el recubrimiento del tracto digestivo. Esto permite que el ácido penetre en las paredes. Las úlceras pépticas también pueden ser causadas por el uso frecuente de analgésicos y otros medicamentos. Beber alcohol y fumar aumenta también su riesgo de desarrollar úlceras.

### Síntomas

Los síntomas pueden incluir un dolor ardiente en el abdomen. El dolor puede ir y venir. Puede empeorar en la noche, y cuando su estómago está vacío. También puede presentar náuseas, vómitos y sangre en las heces. Es posible que pierda peso.

### Tratamiento

Las opciones de tratamiento pueden incluir antiácidos o medicamentos que reduzcan o bloquen la producción de ácido en su estómago. Es posible que se beneficie de medicamentos que protegen el revestimiento de su tracto digestivo. Si tiene una infección de *H. pylori*, puede beneficiarse de un antibiótico que elimine dicha bacteria. Su proveedor de atención médica puede crear un plan de cuidados que sea el adecuado para sus necesidades.