




Mira el video

## Polipectomía (morcelador histeroscópico)



### Descripción general

Este procedimiento ambulatorio se usa para remover uno o varios pólipos - crecimientos que comúnmente se desarrollan sobre en las paredes del útero. El procedimiento se realiza con la ayuda de un dispositivo especializado llamado histeroscopio, que es introduce en el útero a través del cuello uterino. El histeroscopio posee una luz, una cámara y un instrumento cortante llamado morcelador.

### Preparación

Como preparación para el procedimiento, la paciente se coloca en posición y se le administra anestesia local. El médico introduce un espéculo en la vagina para permitir acceso al cuello del útero.

### Acceso al útero

El médico introduce cuidadosamente el histeroscopio en el útero a través del cuello uterino. Se llena el útero con un líquido que pasa a través de un canal en el histeroscopio, dilatándolo, para permitir al médico examinar las paredes uterinas y localizar el polipo.

### Removiendo el polipo

Cuando el histeroscopio está en la posición apropiada, el morcelador (o troceador) se extiende hasta llegar al polipo. El médico activa el dispositivo para cortar y remover partes del polipo por medio de una cuchilla morceladora. Durante el proceso de corte se succionan las partes cortadas hacia el exterior del útero.

### Fin del procedimiento y cuidados postoperatorios

Una vez concluido el procedimiento, el médico retira el líquido y los instrumentos. Luego de una permanencia breve en el cuarto de recuperación, se le permite a la paciente regresar a casa. El médico proporcionará instrucciones específicas para los cuidados postoperatorios. La recuperación total ocurre generalmente dentro de la primera semana después del procedimiento.